



Bot Dic -



Keed Jan. 1894.





## Verzeichniß

derer inn und ausländischen

# Bäume, Stauden

und

## Sommer-Bewächse

des

# Caspar Bosischen Gartens

in vier Ordnungen wie solche sich im Jahr 1747 befunden durch

Johann Ernft Probsten Der Zeit Gartnern.

Leipzig,

Gedruckt ben August Samuel Erucigern, 1747.

keine andere als diesenige, welche ben Herausgebung derer übrigen Verzeichnisse habe, nehmlich denen Garten » Freunden hierdurch kund zu thun, womit ihnen aus dem Caspar Bosischen Garten kann gedienet werden, wurde also vergeblich senn, wenn man darin Beschreibungen von obengemeldeten Sachen suchen wolte. Uebrigens wird der geehrte Leser gebethen, solches als ein Zeichen meiner Dienstfertigkeit anzusehen, womit mich demselben zur beständigen Gewogenheit bestens empfehle.

Leipzig, den 10. Aug. 1747.

#### CLASSIS PRIMA

### PLANTARVM

IN

#### HIBERNACVLO ADSERVANDARVM

#### mil A.

A BROTANVM Africanum, foliotereti, tridentato.

- - Delphinii folio.

ABSINTHIVM latifolium arborescens.

- - maritimum, Lauendulae folio.
- folio tenui, multifido, camphoram fpirans.
  - - insipidum & inodorum.
- - Seriphium gallicum.

A CACIA vera, folio scorpioidis leguminosae.

- - quae Acaciae fimilis Americana, fpinis cornu fimilibus.
- - Americana, fpinis albis, longis, cras-
- - Africana, quae Acaciae similis, foliis myrti paruis, aculeatis, pinnatis, flore coccineo, tetrapetaloide.
- - non Spinosa Fore albo.

ACANTHV S satiuus, mollis Virgilii.

- - rarioribus & breuioribus aculeis.

ACERmaximum, foliis trifidis, aut quin quifidis, Virginianum.

ACETOSA arborescens, subrotundo folio, Insul. Fortunat.

ACRIVIOLA, flore pleno, maiore.

ADHATODA maior, Ecbolium.

- - minor Zeylanensium, angustifolia, store luteolo.

AGERATUM Peruuianum, arboreum,

A GRIMONIA, orientalis, humilis, radice crassissima repente fructu in spicam breuem congesto.

ALATERNOIDES Africana, Ericae folio, floribus albicantibus, et mufcolis.

- - Africana, Lauri ferratae folio.

- folio oblongo serrato.

- folio rotundo non ferrato.

ALATERNUS Hispanica, folio latiore. latifolia, Celastrus dista, folio ex aureo et viridi variegato.

- Africana, Lauri serratae Stapelianae

- - argentea, seu foliis exalbo variis.

- - aurea, foliis ex aureo variis.

ALKEKENGI, fructu paruo verticillato.
ALOE, vulgari fimilis, maior, maculis
albispicta, fucco foetidiore; vera
vulgaris.

ALOE vera, minor; Succotrina angustifolia, spinosa, slore purpureo.

- Americana, muricata.

- Americana, muricata, foliorum margine luteo.

- Americana, folio viridi, rigidissimo, foetido; Piet dicta.

- - Americana, folio Yuccae, arbore-

- Zeylanica, pumila, folio variegato.

- Africana, caulescens, foliis glaucis, caulem ambientibus, spinosis.

- Africana, caulescens, folio crasso, obscure viridi, spinis ad latera, et in dorso armato.

- Africana caulescens, maculata, spinosa

- Africana, caulescens, perfoliata, glauca, non spinosa.

- Africana, arborescens, montana, non spinosa, foliolongissimo, plicatili, slore rubro.

- Africana, margaritifera maior, folio in summitate triangulari, flore subuiridi.

- Africana, margaritifera minor.

- - Africana, margaritifera, minima.

 Africana humilis, ſpinis inermibus, et verrucis obſita.

- - Africana, folio breuissimo, crassissimo, slore subuiridi.

A 2

ALOE Africana, sessilis, foliis carinatis, verrucofis

Africana, humilis, arachnoidea.

Africana, minima, atrouiridis, spinis herbaceis numerofis ornata.

Africana, humilis, triangularis, folio ex albo et viridi variegato.

Africana, ab veraque parte albicantibus maculis notara.

Africana, flore rubro, folio plano, verrucis, ab viraque partealbicantibus notata.

Africana, erecta, rotunda, folio paruo, et in acumen rigidissimum ex-

eunte.

Africana, folio triangulo, longissimo, et angustissimo, floribus luteis, Iris vuaria, vulgo difoetidis; Eta.

Africana, humilis, folio ex albo et viridi variegato, florum petalis re-

flexis, rubris.

Africana, caulescens, foliis magis glaucis, caulem amplectentibus, et in mucronem obtusiorem desinentibus.

Guineensis.

ALTHAEA frutescens Lusitanica, folio rotundiore, vndulato, ad solem micante.

frutescens folio Bryoniae.

AL-

ALTHAE A peregrina, erecta, flore purpureo, striato; Althaea frutex.

- - maritima, arborea, veneta

AMARANTHVS Siculus, radice peren-

AMYGDALVS nana, flore pleno.

ANACAMPSEROS frutescens, folio Portulacae maiore; Crassula. Telephium Portulacae folio.

ANAGYRIS foetida, Cretica, oblongis

foliis, floribus luteis.

ANANAS aculeatus, fructu pyramidato, carne aurea.

- aculeatus, fructu pyramidato, carne rubra.
- Syluestris, Brassiliana; Kerbita.

- - Americana, syluestris.

- - non aculeatus, Pitta dictus.

- - folio vix ferrato, lucide virens.

- - foliis per maiora interualla dispositis.

- aculeatus folio rubescente.

A NEMONE virginiana latiore folio.

ANONIS purpurea, praecox.

ANTIRRHINVM, angusto folio Linariae, eleganter variegato, store rubro, rictu luteo.

APIVM Macedonicum.

APOCYN VM Americanum, folio And drofaemi maioris, flore Lilii conuallium fuauerubente. A POCYNVM erectum, fruticolum, folio fubrotundo, glauco.

- - erectum, Africanum, Salicis folio, fructu villofo.

- erectum flore purpureo.

AQVIFOLIVM, folio aurato.

ARBUTUS folio serrato.

ARISTOLOCHIA Indica, aromatica.

- - Cretica, Pistolochia dicta.

ARTEMISIA Delphinii folio viridi caule rubello

- foliis variegatis.

ARVM Africanum, florealbo, adorato, moschato.

ARVND o satiua, hortensis.

- Indica variegata.

ASCLEPIAS Africana Aizooides, Apphylla.

- Africana Aizooides, flore pulchre fimbriato, maior.

- Africana Aizooides, folio compresso digitato.

- - flore nigro.

we Th

ASCYRVM Balearicum, frutescens, flore luteo, foliis minoribus, subtus verrucosis; Myrto-Cistus Pennaei.

ASPHODELVS, florealbo, striato.

maritimus florealbo.

- A

ASTER maritimus, flauus; Crithmum chryfanthemum, folio tereti, crasso, tridentato.

ASTER

ASTER folio in fummo obtuso; cete-

el po - glutinosus et graueolus.

ASTERISCV Sannuus, foliis ad florem rigidis; Chryfanthenum.

maritimus, patulus; After supinus.

gustifolius; Aster Austriacus.

ASTRAGALOIDES Lustranica, Astra-

ASTRAGALVS Orientalis Caule ab imo

- tuberofus scandens. aii of -

11 210 - maritimus procumbens. -

ATRIPLE x, seu Halimus frutescens latifolius; Portulaca maritima.

- feu Halimus angustifolius, fruticofus, procumbens.

AZEDARACH, seu Arbor Fraxini folio, flore coeruleo.

BARBAIOVIS, florealbo.

na, flore spicato, purpureo.

- incana, flore luteo.

BASELLA Horti Malabarici.

BERMVDIANA, Iridis folio, flore coeruleo

BIDENS Indica, Hieracii folio, caule alato; a Chryfanthemum Curaffaui-

AA

BIGNOS

BIGNONIA Americana arbor, flore luteo, Fraxini folio; Clematis.

BRYONIA Zeylanica, foliis profunde laciniatis,floribus luteis, baccis rubellis.

- - Africana, laciniata, radice tuberosa.

BVGLOSSVM orientale flore luteo.

B v G V L A orientalis villofa flore inuerfo coeruleo alba macula notato.

BVPLEVRIOIDES fiue arbor vmbellifera; Simpla nobla Canarienfis.

Bvxvs arborescens.

- foliis auratis, variegatis.

- - maior foliis per Limbum aureis H. R. P.

#### C.

CALAMINTHA montana, praealta, Pulegii odore, dentatis foliis, floribus coeruleis dilutis.

CAMPANULA maior, lactescens, pyramidalis.

CAMPHORA officinarum; Camphorifera arbor.

CANNACORVS latifolius, vulgaris, flore rubro; Canna Indica.

flore coccineo, splendente.

- - flore luteo punctato.

- - angustifolius, flore flauescente.

- latifolius, flore coccineo, punctato.

- - semine minore, ex Mechoacan.

CAN-

CANNACORVS maiori, angustiore, exacuriore folio, flore magno slauescente, punctis rubris vario.

- latifolius, vulgaris, foliis varie-

gatis.

- glaucophyllus angustifolius.

CAPPARIS Ípinosa, fructu minore, folio rotundo; vera.

CAPSICVM Brafilienfe, filiquis minimis, oblongis, flauis.

CARAGANNA Siberica.

CARDVVS ferox.

CARTHAMVS Africanus frutescens, folio Ilicis spinoso, flore aureo.

CARYOPHILLATA Canadensis.

CARYOPHYLL VS, Flore ex spica prodeunte, flore rubente.

- flore cinereo.

- flore luteo.

- fiue Tunica syluestris, flore pallido roseo, prolifero, id est, vno post alterum ex eodem perianthio succrescente.

Reliquos peculiaris Catalogus recenset.

CASSIA Americana foetida, foliis oblongis, glabris Orobi, odore opii virofo.

- Americana, foliis longis, glabris, odore minus virolo; Callia Filtula Alexandrina.

CAS.

CASSIDA Orientalis Chamaedryos folio

CATARIA angustifolia maior, flore coeruleo purpurascente.

- - Lusitanica, erecta, folio Betonicae, tuberosa radice, slore coerulescen-

- - quae Horminum spicatum, flore et odore Lauendulae.

 quae Sideriris Canadensis altissima Scrophulariae folio slore slauescente.

CEDR VS, folio Cypressi, fructu slauescente; Oxycedrus.

CELTIS, fructu nigricante; Lotus arbor.

CERAS VS Hottentottorum, folio fere oblongo, rotundo, crassissimo.

CERATOCEPHALOS Virginianus foliis laeuibus flore luteo radiato.

CEREVS erectus, altissimus, Surinamenfis, spinis fuscis, costarum numero varians.

- erectus, fructu rubro, non spinoso lanuginosus, spinis albis.

- erectus, spinosissimus, spinis flauis, polygonus, lanugine alba, pallescente.

- - erectus, quadrangulus,costis alarum instar adsurgentibus.

- - scandens minor, trigonus, articulatus.

CERE-

CEREVS scandens maior, trigonus, lucidus, variegati coloris.

- scandens minor, polygonus, articu-

latus.

- Indicus, scolopendrii folio, plano glabro, brachiato.

- erectus, gracilis, polygonus;

CHAMAELAEA tricoccos.

CHAMOMILLA maritima Absinthii folio crasso.

CHENOPODIVM sedi folio minimo; Sedum frutescens, Ericae folio.

CHRYSANT HEMOIDES ofteospermon, Africanum odoratum, spinosum, viscosum.

CINARA acaulos.

lis spicatis, floribus paruis purpureo-violaceis.

OISTVS, Ladanifera.

- mas, maior, folio rotundiore, flore purpureo.

- mas, foliis vndulatis, et crispis.

- - foemina, viridibus foliis saluiae, elatior, flore albo.

- - foliis rosmarini; Ledon.

CLEMATITIS Canadensis trifolia, dendata, flore albo.

CLVTIA Frutex Aethiopicus Portulacae folio, flore ex albido virescente. CNICV s perennis, flore coeruleo; Tingitanus,

COCHLEARIA Glasti folio.

COLOCASIA; Arum Aegyptiacum.

- Caulo puniceo.

COLVTEA Aethiopica, flore phoeniceo, folio Barbae Iouis.

COMA aurea Africana, elatior, lini folio, fimilis Germanicae; fed flore maiore.

- - aurea africana fruticans foliis glaucis et in extremitate trifidis.

CONVOLVULVS Syriacus, Scammonium dictus.

- minor, spicae folio.

- - Althaeae, vel Bryoniae folio, flore

- - maritimus nostras rotundifolius.

CORALLODENDRON triphyllum fpinosum flore ruberrimo.

CORONA SOLIS arborea, folio latissimo Platani.

- - flore pleno.

CORONILLA Hispanica frutescens, maior;

- - scorpioides argentea, Cretica.

COTINVS coriaria Plinii.

COTYLEDON, Afra, arborescens, maior, foliis glaucis, oblongioribus, flore luteo. COTYLEDON Afra, frutescens, foliis orbiculatis, glaucis, limbo purpureo, et maculis viridibus ornatis; similis Sedo.

- - maior arborescens, Afra, foliis minoribus, crassissimis, viridioribus, minutissime punctatis; Capensis, folio semilobato.

lemnobato.

- Afra frutescens, flore vmbellato, coccineo.

- - Afra, folio crasso, lato, laciniato, flosculo aureo.

 Afra, folio minori, tereti, acuminato, viridi, Ficoidis facie, flore albo; Sedum Africanum, vmbellatum, album.

- - Afra, frutescens, foliis longis, retusis depressis, et cruciatis, flore luteo.

CRITHMVM; Foeniculum matitimum minus.

- - maius, odoreapii.

CYCLAMEN florealbo breui.

- aestiuum persicum slore rubro, odorato.
- - Hederae folio autumnale flore albo.
- Hederae folio autumnale, orbiculato circumroseo folio subtus rubente odorato flore.

- - Hederae folio, autumnale flore car-

- - folio rotundo

CYCLAMEN hyemale, folio glabro, florepallido rubro.

- hyemale, folio variegato flore sub-

tus purpureo.

CYNOGLOSSA argentea cretica.

CYPRESSVS meta in fastigium conuo-

- - ramos extra le spargens, mas.

CYTISVS, glabris foliis, subrotundis, frutescens; Trifolium arborescens.

- Africanus, argenteus.

- - viridis.

- - Genista.

D.

ORIA, quae Iacobaça Orientalis, Limonii folio.

DORYCNIVM Monspeliensium.

DRACVNCVLVS polyphyllus caule maculato.

- - Foliorum venis albis.

E.

LICHRYSVM, sylvestre, latifolium,

flore paruo fingulari.

 fyluestre, folio angustiori, longiori, superius viridi, inferius incano, sloro singulari; Heliochrysum saxatile.

- foetidissimum, Africanum, latifo-

lium, calyce aureo.

- - foetidissimum, Africanum, latifolium, calyce argenteo.

ELI-

ELICHRYSVM Africanum, arboreum, folio Saluiae, odore Rorismarini; Elichryso affinis:

EMERVS Americanus siliqua incur-

EPHEDRA, maritima maior.

ERYNGIVM marinum.

EVONYMO Affinis, Aethiopica, sempervirens, fructu globoso, scabro, soliis Salicis, rigidis, serratis.

EVPHORBIVM, enneagonum, cerei effigie, caulibus crassioribus, spinis validioribus armatum.

- - octogonum, cerei effigie.

- heptagonum, cerei effigie.

- hepragonum, spinis longissimis, in apice frugiferis.

- - Afrum, polygonum, spinosum, caule tuberibus ornato, Tithymalus aizooides, spinis validissimis.

- - tetragonum, et pentagonum, spino-

sum; Tithymalus.

- Afrum, caule simplici, squamato, tuberoso; Tithymalus.

- - Afrum, caule fimplici, squamato, Chamaenerii folio; Tithymalus.

- Afrum, minus, caule squamato, tuberoso, et simili Asclepiadis aizooidis minoris.

- trigonum, seu verum antiquo-

EVPHORBIVM trigonum, erectum, minus, brachiatum; Tithymalus.

- angulosum, foliis Nerii latioribus; Tithymalus aizooides, arborescens.

- quod anteuphorbium.

#### F.

FABAGO, Belgarum, siue Peplus Parisiensium; Capparis leguminosa.

 - Afra frutescens, minor, flore flauo, magno, vnguibus petalorum fuscis; Capensis minor.

FERVLA Hispanica lucida.

FICOIDES Africana, quae Melembryanthemum. Tripolii fucculento folio, flore argenteo.

- Africana, quae Mesembryanthe-

mum, Bellidiflorum.

- Afra, erectior, folio Calendulae, flore

aureo; Chrysanthemum.

Africana, acaulos, fóliis Aloes latissimis, crassissimis, lucidis, flore aureo, amplo; Mesembryanthemum, folio scalprato.

- Africana, acaulos, folio triangulari, lucido, obtufo, flore aureo, magno.

 Africana, acaulos, foliis triangularibus, longissimis, punctatis.

- - Africana, quae Mesembryanthemum tortuosum, foliis semperuiui, congestis, candidis storibus.

FI-

FICOIDES Africana, folio variegato, raspero, ad apicem stella spinosa ornato, store violaceo; Mesembryanthemum radiatum, ramulis prolixis, recumbentibus.

 Africana, folio variegato, aspero, ad apicem stella spinosa ornato, store purpureo-violaceo; Mesembryan-

themum radiatum humile.

- Africana, folio triangulari, securis forma; Mesembryanthemum solio dolabriformi, slore extus coccineo, intus aureo.

- - Africana, folio triangulari, glauco, perfoliato, breuissimo, apice spinoso; Mesembryanthemum perfoliatum, foliis minoribus, diacanthis.

- Africana frutescens, perfoliata, folio triangulari, glauco, punctato; Mesembryanthemum perfoliatum, foliis maioribus, triacanthis, flore di-

lute purpureo.

breui, glauco, ad tres margines aculeato; Mesembryanthemum deltoides, et dorso, et lateribus muricatis, minus, flore purpurascente.

 Africana, quae Mesembryanthemum deltoides, et dorso, et lateribus muricatis, maius, floris colore viola-

ceo.

FICOIDES Africana, fruticans, folio triangulari, scabro, tenui; Mesembryanthemum purpureum, scabrum, staminibus expansis.

- Africana; Mesembryanthemum crassifolium, repens, slore purpu-

reo.

- Africana, quae Mesembryanthemum, foliis verruculiformibus, sloribus melinis, vmbellatis.

- Africana, quae Mesembryanthemum frutescens, flore purpureo, rariore.

 Africana, fiue Mesembryanthemum acinaciforme, flore amplissimo, purpureo.

- - Africana, fiue Mesembryanthemum falcatum, maius, flore purpureo,

mediocri.

- - Africana, fiue Mesembryanthemum falcatum, minus, slore carneo, minore.

- Africana, fruticola, caule, lanugine argentea ornato, folio tereti, paruo, longo, guttulis argenteis, quasi scabro; Mesembryanthemum pilosum, micans, slore purpureo.

- Africana, fruticosa, foliis teretibus, tenuibus, acutis, longioribus; Mefembryanthemum pilosum, micans, flore purpureo pallidiore.

- - Africana, quae Melembryanthemum micans,

micans, flore phoeniceo, filamentis atris.

FICOIDES Africana, quae Mesembryanthemum pugioniforme, flore amplo, stramineo.

- Africana, erecta, foliis oblongis, triangularibus, glaucis, et punctatis,

flore luteo.

Fic vs, communis.

- - Bengalenfis, folio subrotundo.

- - fructu rubro.

FRYTEX peregrinus, horto Bosiano Yerua mora: Bosiana nunc Linnaeo dictus,

G.

GALANGA, maior.

GALE seu Rhus myrtifolia, monspelica. GENISTA, iuncea, Hispanica.

- - luncea flore pleno.

GENISTELLA, herbacea, flore luteo;
Chamaespartium.

GERANIVM, Africanum, Alchimillae, hirfuto folio, medio, obscuriore circulo notato, sloribus rubicundis.

- - Africanum, arborescens, maluae fo-

lio, argentato.

- - Africanum, arborescens, maluae folio, plano, flore eleganti, Kermesino.

- - Africanum, foliis inferioribus Afari,
B 2 fupe-

fuperioribus Staphidisagriae, splendentibus, et acetosae sapore.

GERANIUM Africanum, vitis folio, odore Melissae.

- Africanum, Alchimillae, hirfuto folio, floribus albidis.

- Africanum, trifte, noctu olens, folio longo, laciniato, hirfuto.

- - Africanum, tuberofum, et nodofum, aquilegiae folio, noctu olens.

- - Africanum, frutescens, foliis crassis, glaucis, acetosae sapore.

- - Africanum, Betonicae folio.

- - Africanum, frutescens, alceae folio, flore coccineo, fulgidissimo;

- haematodes, flore variegato; Lanca-

strense.

- - hirsutum odoratissimum.

GNAPHALIVM, maritimum.

GRANADILLA, pentaphyllos, flore coeruleo, magno.

- folio tricuspidi, flore paruo, flaue-

scente.

G v A I A v A, Americana, arborescens, alba, dulcis.

GVIDONIA, Vlmi foliis, floribus roseis Vlmi facie, arbuscula Aethiopica.

H.

HAEMANTHVS, Africanus, H. L.B. caule maculato; Narcissus Indicus, puniceus.

HAR-

HARMALA Dodonaei.

HEDER A, monophyllos, conucluuli folio; fiue Menispermum, aut clematis Virginiana scandens, hederaceo folio.

HEDYSARVM, triphyllum, Canadense. HELIOTROPIVM, Canariense, arborescens, Scorodoniae folio.

HERMANNIA, frutescens, folio Ibisci, hirsuto, molli; Ketmia.

HORMINVM sanguineum radice tube-

HYACINTHVS, Indicus, tuberofus.

- - Indicus, tuberosus, flore pleno, albo.

- Itellatus Peruanus.

HYOSCYAMVS, albus, maior, vmbilico floris viridi.

 maior, albo fimilis, vmbilico floris atro purpureo.

- Creticus, luteus, maior.

HYPERICVM, frutescens, Canariense.
- frutescens, foetidum, minus.

I.
A C E A, arborea, argentea, Rhagusina.
- luteo flore, capite spinoso, folio integro, alio diusso; Carduus Graecus, erysimi solio.

- Lusitanica semper virens.

I A C O B A E A, maritima.
- maritima, latifolia.

B

I ASMINVM, vulgatius, flore albo.

- - humilius, magno flore, Catalonicum.

- humile, luteum.

- - luteum, vulgo dictum bacciferum.

- Indicum, flauum, odoratissimum.

- - azoricum, trifoliatum, scandens, flore albo, odoratissimo.

- - Arabicum, aurantii folio, flore albo,

pleno.

- Arabicum flore simplici.

quod Coffee arbor; Iasminum Arabicum, Castaneae folio, slore albo, odoratissimo.

IVNIPERVS, Bormudiana.

- - Virginiana foliis vbique Iuniperinis.

#### K.

## KETMIA, Syrorum quibusdam, flore

- Syrorum, flore purpuro - violaceo.

- - Syrorum, flore albo.

- - Sinenfis, fructu subrotundo, flore simplici.

- Africana, populi folio; Althaea ro-

sea, peregrina.

- - Aegyptiaca, semine moschato, Abelmosch dicta

- - Americana, folio Papayae, flore magno, flauescente, fundo purpureo, fructu fructu pyramidali, hexagono, erecto; folio Manihot ferrato.

KLEINIA, Tithymaloides Nerii Folio.

.63.45. L.

APATHVM, praestantissimum, Rhabarbarum.

LARIX

LAVENDVLA, folio multifido.

- - folio multifido, flore albo.

- - folio multifido tenuiter dissecto.

- - latifolia.

LAVRO Cerasus.

- - folio variegato.

LAVRVS, Indica.

- - latifolia mas.

- - vulgaris mas.

- - vulgatior, folio elegantiffimo, variegato, aureo.

- vulgaris folio vndulato.

LENTISCVS, vulgaris.

LEONVRVS, Africanus, Sideritidis folio, flore phoeniceo, maiore.

- - maior, capitis bonae spei; Melissae

- - Americanus; Cardiaca Nepetae fo-

LEVCANTHEMVM, Canariense, sapore pyrethri.

LEVCOIVM, frutescens, folio argentato, flore luteo, pleno; et plures Leucoii species.

3 4

LEVCOIVM maritimum laciniarum.

- Foliis crispis.

LIGVSTRVM, foliise luteo variegatis.

LILAC Syringa Perfica.

- foliis Laciniatis.

LILIO - NARCISSVS, Indicus, faturato colore purpurascens.

- Indicus, flore albo, exterius rubente.

- Iacobaeus flore sanguineo, nutante.

LIMONIVM, maius; Behen rubrum.

- minus, Bellidis folio, flagellis foeniculaceis.
- peregrinum, foliis Asplenii.

- Gallas ferens.

LINVM maritimum luteum.

Lotvs, Polyceratos, frutescens, incana, alba, maior, latifolia; Lybica Dalechampii.

polyceratos, frutescens, incana, alba, filiquis curtis; haemorrhoidalis.

- polyceratos, frutescens, Cretica, argentea.

- angustifolia, flore luteo, et purpureo, ex Infula S. Iacobi.

LyCHNIS, frutescens, myrti folio; Been albo fimilis.

Graeca, sedi arborescentis folio et lacie, flore albo.

LYSIMACHIA, semper virens, spicata, flore albo; Ephemerum.

- Canadenfis, flore luteo, folio Islappae.

MAIO-

#### M.

MALVA, humifula, minima Sherardi.
MALVS AVRANTIA Anglica Folio et
Fruetu variegato.

- Agostarolo, quae mense Augusto ma-

turat.

- - Co Fior et Foglie rossegiante, Flore foliisque rubellis.

- Con Scorza grossa, cortice crasso.

- - Con Scorza sottile, cortice tenui.

- Bergamotto.

- Lusitanica, di Portugal

- Cretica, foliis crispis, di Candia co Foglie rizze.

- Cretica Foliis planis, di Candia con

Foglie Lisse.

- Flore duplici, con Fior doppio.

- - Folio crispo longo.

- Folio crispo rotundo.

- Folio crispo, folio et fructu variega-

to, Riche depouille.

- - Folio angusto, folio et fructu variegato: Turcica seu Turquine angustifolia.

- - Folio obtuso cortice crasso.

- - Folio Salicis.

- Fructuacido maiore.

- - Fructuacido minore.

MALVS AVRANTIA Fructumalo Citrio praegnante, Foetifera: Bizaria Limonata.

 Fruêtu malo Citrio praegnante Folio ex albo variegato.

- - Fructuacri dulcique medulla maiore.

- - Fructu acri dulcique medulla minore.

- - Hierichunteum medulla rubra.

- - Fruetu corniculato seuHermaphroditicum.
- - Fructu virgato et striato.
- Fructu stellato.
- - Fructu verrucoso.
- - Fructu maximo verrucolo. Gigante verrucolo.
- Nana.

- - Fructu pyriformi: Peretto.

- - Fructu mellis odore : Mellerofa odorata.
- - Fructu melonis: Incanellato.
- - Fructu Limae, inlimata.
- - Fructu Limonii: Limonii facie,
- - Fructu monstroso; foliis crispis.
- - Syluestris.
  - maior cortice amaro medulla fuaue dulci.
- - Sinensis fructu magno oblongo.
- - Sinensis fructumagno rotundo.
- - Sinensis fructu paruo.
- - Fructu Quercino,

#### MALVS AVRANTIA, Pomum Adami.

- - Fructu maximo : Pompelmoes
Orientale.

- - Fructu maximo: Pompelmoes Orientale folio crispo.

- - Fructumaximo: Pompelmoes Occi-

- - Triplici fructu, Clemaat Batauis dicta, Kloster Apfel.

MALVS LIMONIA Fructu pufillo dulci. Limonetto dulce.

- - Fructu pufillo, dulcis Romana.

- - Fructumaiore dulci.

- - Fructus Cortice crasso.

- - Fructus Cortice tenui.

- Fructu mucronato.

- - Pyri effigie, Spadafora.

- - Fructu digitato: Zatella.

- - Aurantio praegnans, Bizaria; Limonium foetiferum.

- - Fructu Cucumerino.

- - Fructu Pyri minore, Peretta.

- - Fructu Pyri maiore, Bergamotto.

- - Fructu Verrucolo: seu scabiosa.

- - Fructu Cucurbitaceo, Zuchetta.

- - Pomum Adami seu Lima acida maior.

- - Pomum Adami fructu saturate luteo.

- - Pomum Paradisi.

- - Pusilla Pila.

- - Romana.

## MALVS LIMONIA, Pufilla Calabriae fructu acido.

- - Fructu magno dulci folio variegato.

- - Salicis folio.

- Lauri folio.

- - Latifolia serrata.

- - Fructu inaurato.

- - Fructu quercino.

- - Folio inaurato, Geel op het blaat.

- - Fructu monstroso, Florentina.

- Hispanica, di Spagna.

#### MALVS LIMONIA di Gallicia.

- - di Valencia.

- Flore pleno.

- Flore rubente.

- Spadafora Grande.

. - Spadafora Regina.

- Grobolosa.

. - Ligustica.

- Montana, Laura Gentile.

- Spongino di Spagna:

- Palladina della gran sorte.

- Pontina di Spagna Piccola.

. - Straparente.

- Gout Limonia.

\_ - Salerno di Genoua.

. - Salerno Monstroso.

- Citrata parua: Cedro Piccolo.

- - Citrata fructu longo maximo: Cedro grosso Pondeloto.

MA.

MALVS LIMONIA Citrata fructu ro-

- - Citrata fructu monstroso.

- - fructu Moschato.

- - Fruetu mucronato.

- - Barbarina, Cedrato Barbarino,

- - Citrea Syluestris.

- - Citrea Medulla acri.

- - Medulla dulci.

MARRVBIASTRVM Cardacae for

- - Hispanicum calyce stellato.

MARRVBIVM foliis sericeis argen-

MARVM, Syriacum.

- Hifpanicum, nigrum, fruticans, odoreminus acuto, flore purpurascente.

MASTICHINA.

MEDICA, marina.

MEDICAGO, trifolia, frutescens, incana; Medica.

MELIANTHVS, maior.

- - minor, foetens.

MELOGACTVS, Americana, minor, la-Etescens.

MESPILVS, Apii folio, laciniato; Aronia.

MILLEFOLIVM, flore luteo.

- - nobile.

MIMOSA, folio Sennae, lato, spinosa, Aeschynomene spinosa, latifolia.

- - maior, frutescens, spinosa; Sensitiua maior, siue Aeschynomene.

- - fpuria de Phernambuc; Mimola Italica.

MITELLA, Americana, florum albidis petalis, fimbriatis, Cortulae fimilis.

MOLDAVICA, Americana, trifolia, odore graui; Cedronella Canarienfis.

MOLLE.

Mvs A, fructu cucumerino, longiori.

MYRRHIS, Sicula, elatior, tenuioribus foliis; Chaerophyllum ficulum fophiae folio, villoso femine.

MYRTVS, communis, Italica.

- - folio odore Citri, cauliculis rubentibus.
- - foliis latioribus, Romana.

- - angustifolia, Baetica.

- - foliis latioribus, flore pleno.

- - minor, vulgaris siue Tarentina.
- - foliis minimis et mucronatis.

 foliis mucronatis, ex albo et viridi variegatis.

- - Balfamica foliis mali Granati, foliis quandoque ternis.

- - Buxi folio.

ARCISCUS, maritimus.

NERIVM, floribus rubescentibus: Rhododendrum.

flore simplici, albo.

Indicum, latifolium, flore variegato, odorato, pleno.

angustifolium flore carneo odorato.

# ENANTHE Myani.

- Apii folio.

OLEA, fatiua, domestica.

O'PVNTIA, maxima, folio spinoso, latisfimo, longissimo.

major, spinis validissimis, sauescenti-

bus munita; Tuna.

quae Tuna elatior, spinis validis nigricantibus.

vulgo Herbariorum.

Curassauica, minima.

## ALIVRVS.

PALMA, dactylifera, maior.

dactylifera, folio flabelliformi, hu-

milis, non spinosa.

maior, dactylifera, folio flabelliformi, pedunculo ad latera durissimis magnisque spinis armato.

PALMA foliis longissimis, pendulis, absque vllo pedunculo, ex caudice glabro enatis; Draco arbor.

PARONYCHIA Hispanica.

PERICLYMENVM, Virginianum, femper virens, et florens.

- - Virginianum, foliis variegatis.

PERIPLOCA, folis oblongis.

- Monspeliaca, foliis acutioribus; Apocynum scandens, Scammonii facie, amplexicaule.

- Africana, foliis oblongis, angustis,

flore luteolo.

PHALANGIVM, Africanum, foliis cepaceis, floribus spicatis, aureis; Aloe falso dicta.

- Africanum, foliis Ficoidis, floribus fpicatis, aureis.

PHASEOLVS, Africanus, perennis, cochleato flore, Caracalla dictus.

- Africanus, Tamarindi foliis, qui Abrus dicitur, fructu coccineo, hilo nigro. \*

- Indicus, perennis, floribus purpura-

scentibus.

PHILLYREA, folio Ligustri.

- - angustifolia prima.

PHLOMIS, fruticosa, Saluiae folio, latiore, flore luteo; Saluia fatua.

Рнуто L асса, Americana, fruetu minori nori; Amaranthus baccifer, Circaeae folio.

PIMPINELLA, spinosa, semper virens.

PINVS, fatiua.

- - Siberiensis.

PLVMBAGO, Ceylanensium, folio splendente, Ocymastri slore lacteo.

POLIVM, montanum, luteum, magis o-

- montanum, repens, incanum, flore

purpurascente.

PSE VD O Acacia Virginiana, non spinofae, nomine missa; Amorpha Linnaei.

PSEVDO, DICTAMNVS, verticillatus, inodorus, maior.

 Hispanicus, amplissimo folio, candicante, et villoso.

PVNICA, quae malum granatum fert.

- - seu granatus, slore pleno, maiore; Balaustia.

PYRETHRYM.

#### R.

RAPVNTIVM, maximum, coccineo, spicato flore; Flos Cardinalis, flore Kermesino.

- Americanum, flore dilute coeruleo;

Rapunculus.

RHABARBARVM crifpum Muntingii. RHAMNVS cortice albo angustifolius.

RHA-

IRHAMNVS spinis oblongis, cortice albo, Monspeliensium.

RHAMNI primialtera species.

RICINVS, minor, perennis, Americanus.

ROSMARIN vs hortenfis.

striatus, siue aureus.

- hortenfis, angustiore folio, argenteus.

R v B v s flore pleno.

Rvscvs, angustifolius, fructu folio innascente.

- Latifolius, fructu folio insidente; Laurus Alexandrina.

- angustifolius, fructu summis ramulis innascente; Laurus Alexandrina,

myrtifolius, aculeatus.

R v T A, Chalepenfis, latifolia, villofis petalis.

hortensis, minor, tenuifolia, foliis variegatis, argenteis.

ALICASTR V M Buxbaumii.

SANTOLINA, foliis teretibus; Abrotanum, foemina, flore fulphureo.

- flore maiore, foliis villosis, et incanis.

- foliis, obscure virentibus, asperioribus, flore aureo.

SATVREIA Spicata, siue S. Iuliani quorundam; Tragoriganum.

SAVRVRVS, repens, lanceolatus; Serpenpentaria repens, Bryoniae nigrae folio ampliore, pingui, Virginiana.

SCABIOSA, Africana frutescens, foliis crenatis, flore pallido, coeruleo.

- - perennis flore sulphureo.

SCILLA, vulgaris, radice rubra.

SCLAREA, folio triangulari, caule to-

- Indica, arborescens, calyce campanulato, flore pulchro aurantio, Leonuri maioris simili Horti Waltheriani.
- - Syriaca flore albo.
- S CR OPH V LARIA, Hispanica, Sambuci folio, glabro, sfore viridi, et phoeniceo magno.

- Ruta canina dicta.

- - Pyrenaica.

SED v M, maius, arborescens.

- foliis variegatis.

- - Canarium, foliis omnium maximis.

- Africanum, frutescens, folio longo, ferrato, confertim nato,

- - montanum, tomentosum, gnaphaloi-

des.

- - minus a rupe S. Vincentii; rupestre

repens.

- Afrum, faxatile, foliolis Sedi vulgaris, in rosam vere compositis; Crasfula orbicularis, repens, folio Semperuiui.

SE-

SEDVM Africanum, humile, Ficoidis folio; Crassiula caesposa, longifolia.

SENECIO, Africanus, frutescens, folio retuso; Conyza Africana.

- Africanus, arborescens, folio serrato.

- Africanus, arborescens, folio ficoidis.

SESBAN Alpini.

SIDERITIS, Alpina, hyssopifolia.

- - Orientalis, Phlomidis folio.

SILIQ V A, edulis.

SILIQ VASTRVM, arbor Iudae.

SMILAX, aspera, fructurubente.
- - `quodammodo spinosa, fructunigro.

- - non spinosa.

SMYRNIVM Matthioli.

SOLANVM, scandens, foliis ex albovariegatis, flore coeruleo.

- - pomiferum, frutescens, spinosum, Africanum, flore Borraginis, folio Quercus, profunde laciniato.

 pomiferum, frutescens, spinosum, Indicum, folio incano, caule spinoso, fructu rotundo.

- molle, foliorum neruis et aculeis flauescentibus, fructu mammoso.

 pomiferum, frutescens, spinosum, Indicum, folio, et caule spinoso; magis viridi.

- fruticolum, bacciferum; Amomum Plinii Strychnodendron.

SOLANV M scandens flore albo.

SPHON-

SPHONDILIVM angustifolium Panax Heracleonis.

- - angustifolium.

STACHYS, Lustianica, frutescens maior;
Teucrium Regium.

- - Canarienfis, frutescens, verbasci folio, flore albo.

STOECHAS, purpurea, Arabica.

- - Folio serrato.

SVBER latifolium, perpetuo virens; Phellos.

T.

AMARISCUS Germanica.

- Narbonensis.

TANACETV M, Africanum, arborescens, Lauendulae multifido folio.

TAXVS Syluestris.

TELEPHIOIDES Legitimum Imperati.

TEREBINTHVS; Pistacia vera.

- - vulgaris, mas.

TETRAGONOCARPVS, Africanus, fruticans, folio angusto,

TEVCRIVM, calice tubulato, flore luteolo.

- - Baeticum, calyce campanulato.

THAPSIA Canadenfis lutea.

THLASPIDIV M, frutico sum, folio Leucoii, semper slorens.

- Perficum, folio ex viridi et aureo variegato.

THY-

THYMVS, moschatus, vulgari duriori similis; Serpillum moschatum.

TINVS, prior Clusii.

TITHYMALVS, Characias, amygdaloides; Characias.

- - Indicus, frutescens, ramolissimus, pene aphyllos.

- - Indicus frutescens.

- - aphyllos Mauritaniae, Imper.

- maritimus, angustiore Anacampserotis folio, in spinam breuissimam desinente.
- Orientalis, Anacamplerotis folio, flore magno, cristato.

TOXICODENDRON, trifoliatum, re-Lum, foliis minoribus.

TRAGACANTHA.

TRIFOLIVM, bitumen redolens, TVLIPIFERA, arbor Virginiana,

V

VERONICA Americana eresta fru-

VIBVR NVM, Americanum, odoratum, folio Vrticae, floribus miniatis.

VITEX, foliis angustis, cannabis mode dispositis, flore coeruleo.

- - fine agnus castus.

- - trifolia, maior, Indica, ferrata.

X.

XYLON, arboreum; Golfypium fru; tescens.

Y.

Y v c c a, folio aloes.

- Americana caulescens altissima arboris draconis folio.

Z.

ZINGIBER, latifolium, fyluestre.
ZIZIPH Vs.
ZYGIS serpillum tomentosum.



CA

### CLASSIS SECVNDA

### PLANTARVM

PERENNIVM.

A.

### ABROTANUM.

- - campestre cauliculis rubentibus.

ABSINTHIVM, vulgare, latifolium.

- - insipidum.

- - Ponticum, tenuifolium, incanum.

- - marinum, album; Seriphium Belgi-

ACANTHUS aculeatus.

ACETOSA, maior, pratenfis.

- Hispanica, maxima.

- - rotundifolia, hortensis.

- - foliorum luteolis venis.

- - maior, lanceolata.

- - minor, lanceolata.

- - pratensis folio crispo.

ACONITVM, luteum, lycoctonum, maius; Napellus,

- - idem, flore pallidiore, luteo.

- . falutiferum; Anthora.

- - flore coeruleo; Napellus, flore maiore.

A COR V S, fiue Calamus aromaticus.

ADI-

ADIANTHY M album.

ADONIS, Hellebori radice; Helleborus Hippocratis, flore luteo; Pseudo-Elleborum.

AGERATVM, quod Eupatorium Mesue.
AGRIMONIA, odorata; Eupatorium

- - vulgaris.

- - minor, flore albo.

AIVGA.

ALCEA, vulgaris, flore roleo.

- - vulgaris, candidiore flore.

- - cannabina, fruticola;

- - Thuringiaca, folio molli, flore maiori roseo.

- - Virginiana; Abutilon, vel Althaea Ricini folio.

- - hortensis vitis folio.

ALCHIMILLA, maior.

- - minor, perennis, alpina.

ALISMA.

ALKEKENGI.

ALLIVM, satiuum.

- alterum, caulis summo in circulum conuoluto; aliis Serpentinum dicum.

- - vrsinum, latifolium, syluestre.

- - angustifolium, montanum, bicorne.

- pratense.

- angustifolium, caule folia perforante, vitigineum.

CS

ALSINE, memorum altissima.

- - pratensis, gramineo folio, am-

- - pratensis, gramineo folio, angustiore.

ALTHAEA, vulgaris, folio molli, flore carneo.

- - purpurascente flore.

ALYSSVM fruticosum incanum Thlaspi Mechlinense.

AMMI, perenne; Falcaria.

ANACAMPSEROS seu Fabaria, slore albo.

- - seu Telephium, radice rosam spirante.
- - minor; Sedum.

- fore purpureo.

ANAGALLIS, lutea memorum.

ANDROSAEMVM, foetidum, maximum, frutescens; Siciliana.

ANEMONE, montana, flore albo, maior fyluestris.

- hortenfis; et variae eius species.

ANEMONOIDES, florealbo; Ranuncu-

- - feu Nemorosa, flore incarnato; Ranunculus.
- - flore pleno, purpurascente.

- flore luteo, vnico.

- - flore luteo, bino, et terno; Ranunculus. ANEMONOIDES flore albo, pleno.

ANGELICA, satiua.

- - pratenfis minor.

- - Tyluestris, maior, minoribus foliis.

- - Íyluestris, repens; Podagraria.

ANONIS, spinosa, flore purpureo, vulgaris.

- fpinula, flore albo.

- fpinis carens, floribus candidis.

- spinis carens, flore purpureo.

ANTIRRHINVM, maius, flore rubro, rictu luteo.

- - flore albo, richu luteo.

- - flore carneo, rictu aureo.

AP108, Americana; glans terrestris.

APIVM, tenuifolium.

- folio crispo.

- Sariuum.

- - dulce; celeri Italorum; apium.

- - Macedonicum.

- Folio subrotundo.

APOCYNYM, Americanum, aut Syriacum maximum, latifolium, glomeroso flore roseo, odorato, in vmbella.

- - erectum, Canadense, angustifolium,

A Q VILEGIA hortensis slore coeruleo pleno.

- - hortensis flore coeruleo in albo va-

riegato.

AQVILEGIA hortenfis flore pallide coeruleo pleno.

hortensis flore albo pleno.

- hortenfis flore rubro pleno.

- horrensis flore violaceo in albo variegato pleno.

hortensis flore rubro in albo varie-

gato pleno.

hortensis flore cinereo simplici.

- hortenfis flore rubro fimplici.

- hortensis flore albo simplici. - hortensis flore coeruleo simplici.

- stellara flore rubro pleno,

- stellata flore albo pleno.

- stellata flore coeruleo pleno.

- stellata flore purpureo pleno.

- stellata flore albo simplici.

- stellara flore rubro simplici.

- pumila, praecox, Canadensis.

ARISTOLOCHIA, longa.

ARTEMISIA, caule rubro.

flore variegato.

- caule, ex viridi albicante.

ARVM vu gare non maculatum.

maculatum maculis nigris.

venis albis.

ARVND o variegata.

- vu garis Phragmites.

ASAR VM.

ASCLEPIAS flore luteolo.

flore albo; Vinceroxicum.

ASCLE

ASCLEPIAS, seu Vincetoxicum, slore nigro.

ASCYRVM, magno flore; Androsaemum maximum, bacciferum.

ASPARAGVS, hortenfis.

ASPHODALVS, flore luteo, folio fistu-

ASPLENIVM, seu Ceterach.

ASTER, qui Helenium vocatur.

- - nouae Angliae, flore purpureo-violaceo.

- noui Belgii, vmbellatus.

- - folio falicis, hirfuto, flore luteo, Aufriacus.
- - folio glabro, falicis, flore luteo;

- Atticus, flore coeruleo.

- folio salicis, angustiore; Austriacus.

- flore albo, specioso, folio angusto; an ferotinus, procerior, ramosus, bellidis syluestris flore.

- - Americanus latifolius puniceis cau-

ASTERISCVS, folio angusto, aspero, ob-

scure viridi, non serrato; de reliquo similis Asteri IV. Austriaco.

ASTRAGALVS, folio subdulci.

- Orientalis altissimus, folio Galegae, flore paruo, flauescente, siliqua curta;

- - 'purpureus, Monspeliacus.

- - repens, filiqua curta, tenuiore folio, flore flore ex coeruleo purpurascen-

ASTRAGALVS repens, filiqua curta; Glaux, flore ochroleuco.

- luteus, perennis, filiqua gemella, rotunda, vesscam referente.

ASTRANTIA.

BALLOTTE.

BALSAMITA, quae Mentha Saracenica, et Graeca.

BELLADONNA, Solanum maius.

BELLIS hortensis slore rubro multiplici fistuloso H. R. Par.

- flore pleno magno ex candido et rubro vario.
- - fyluestris minor flore misto.
- - horrensis flore pleno magno vel paruo albo.
- flore carneo toto fistuloso.
- - flore carneo radio tantum fistuloso.
- flore alboradio fistuloso.
- Prolifera variegata.

BETONICA, Danica, siue maior ramosa,

- - Orientalis folio longissimo.
- purpurea, vulgaris.
- - flore carneo.
- - flore variegato.

BISTORTA, maior.

BLATTARIA, flore albo, extus violaceo.

BLAT-

BLATTARIA flore luteo, rugoso, verba-

- nigrae violae flore.

BRUNELLA, flore magno, coeruleo.

- - folio non dissecto, flore albo.

- - folio laciniato, flore purpureo.

BRYONIA, alba.

- - baccis nigris.

BVGLOSSVM, fyluestre, angustifolium.

- - syluestre angustifolium, florealbo.

- - maiore flore, coeruleo, diluto.

- - latifolium, flore minori borraginis; Borrago, femper virens, maior.

- montanum, flore atropurpureo.

B v G v LA, montana, villosa, flore coeruleo pallidiore.

- - flore coeruleo.

- - flore albo.

- - syluestris, flore suauerubente.

BVPHTHALMVM, tanaceti minoris folio, flore aureo; Buphthalmum Chryfanthemo congener.

- feu Leucanthemum vulgare.

Byplevrym, folio angustiore.

- - larifolium.

BVTOMVS, flore roseo; Iuncus floridus.

CACVEALVS.

CALAMINTHA, vulgaris.

- - montana folio aureis maculis notato.

- magno flore.

CAME-

CALCEOLVS Mariae.

CAMERARIA, Alfine fluuiatilis.

CAMPANVLA, Perficae folio, angusto, flore coeruleo.

- Le Perficae folio, flore coeruleo, pleno.

- - hortenfis folio et flore oblongo: viola mariana Dodonaei.

- - Perficae folio, angusto, maior, slore albo.

- - Perficae folio, angusto, flore albo, pleno.

- - radice esculenta.

- quae Rapunculus.

- - İyluestris, inferius fere rotundifolia.

- - maxima, foliis latissimis, flore coeruleo.

- maxima, foliis latissimis, flore albo.

- - folio vrticae, maiore, flore coeruleo.

- - folio vrticae, maiore, flore albo.

- - folio vrticae, maiore, flore coeruleo pleno.

- folio vrticae, maiore, flore albo, ple-

no.

- conglomerata, Pratenfis; Trachelium, flore pallido, coeruleo.

CAPNOIDES, flore purpureo et luteo; Pseudo-fumaria Indica.

CARDAMINE, flore maiore, elatior; Nasturtium aquaticum, maius, et amarum.

CARDIACA, florealbo.

- - flore roseo, pallido.

CAR-

CARDIAGA crispa.

CARDVVS, tomentofus, Acanthi for lio, altissimus, Lusitanicus.

- - nemorum altissimus; Cirsium.

- - scolymus syluestris.

CARLINA, acaulos.

CARYOPHYLLATA, vulgaris.

- - vulgaris, folio variegato.

- - Alpina, aureo flore magno.

- - capite nutante, aquatica.

- - montana, flore luteo, nutante.

CARYOPHYLLVS,plumofus,fyluestris, flore albo.

- barbatus, syluestris, flore rubro,

- - barbatus idem, vel Carthulianorum flos simplex, aut armerius.

- Syluestris, flore purpureo.

- - fyluestris, siue tunica syluestris mi-

CASSIDA, Lamii folio, flore ex parte purpurascente, vel exalbido.

- vulgaris; Scutellaria.

CATARIA, maior, vulgaris; Nepeta.

CEPA.

- - vulgaris rotunda alba.

- - vulgaris longa,

GENTAVRIVM, maius, Orientale, ere-Eum, glastifolium, flore luteo.

CHAEROPHYLLVM, palustre, latifolium,florealbo; Myrrhis palustris.

CHAE-

CHAEROPHYLLVM, flore rubello.

CHAMAECLEMA, Hedera terrestris.

- folio variegato.

CHAMAEDRYS, maior, repens.

- minor, repens.

- - multiflora, repens, Hilpan. folio pulchre laciniato, flore albido, facie Teucrii Orientalis.

CHAMAEMELVM, Romanum, fine nobile.

CHAMAENERION, quod Lysimachia speciosa.

- - aquaticum, filiquosum, hirsutum, floremagno; Lysimachia.

- - glabrum; Lysimachia purpurea, siliquosa, an silius ante patrem.

CHELIDONIVM.

- - foliis, et floribus valde laciniatis.

CHONDRILLA, sonchi folio, slore purpurascente.

- - sonchi folio flore luteo.

CHRISTOPHORIANA.

CHRYSOSPLENIVM; Saxifraga aurea.

Cichorivm.

- - norealdo.

- - flore roseo.

- - hortense: Endiuiz.

- - folio crispo.

CICVTARIA latifolia foetidissima.

CINARA.

- - hortenfis, aculeata.

CIRCAEA, Lutetiana.

CIRSIVM maximum incanum bulbofa radice Cluf.

- - maius fingulari capitulo magno vel incano varie dissectum.
- - flore purpureo.
- flore albo.
- - acaule, flore purpureo; Carduus acaulis.
- - pratense, foliis latioribus, diuisis, viridibus, sloribus slauescentibus, in capite folioso.
- - Lactucae folio.
- - Caule alato.

CISTVS, folio Rorismarini latiore; Le-

CLEMATITIS; Flammula surrecta, alba; Flammula altera.

- - Pannonica, erecta, flore violaceo.

- - scandens, folio laciniato, store coe-

- - flore coeruleo, pleno.

CLINOPODIVM, vulgare.

COCHLEARIA, folio cubitali; Armoracia vulgaris.

COLCHICVM vulgare.

- - vulgare purpurascente flore.

- - candidum multiflorum.

- - pleno flore variegatum.

- - pleno flore striatum.

CONVALLIVM flos: Lilium Con-

uallium foliis ex aureo et viridi

- - Coma aurea.

CONVALLIVM flos hortenfis latifolius

- latifolius lyluestris.

- - flore rubente.

- - flore ex rubro striato.

CONVOLVVLVS minor aduersis slòre

- maior flore albo.

CONYZA, Pyrenaica, floreaureo, foliis rugofis Primulae veris.

CORONAIMPERIALIS, vulgaris.

- - folio argentato. Vid. Catal. Florum.

CORONA SOLIS, altissima, Virginiana; Chrysanthemum angustifolium, viride.

- - paruo flore, radice tuberosa, esculenta; Chrysanthemum.

- - foliis amplioribus, laciniatis; Doronicum Americanum maius.

- foliis angustioribus, laciniatis.

- - quae Chrysanthemum Americanum, perenne latifolium.

CORONILLA, flore vario, herbacea.

CRACCA, sylvatica, maior, perennis.

- - angustifolia.

CRAMBE, Orientalis, dentis leonis folio, Erucaginis facie. CROCVS, autumnalis, flore coerule-

- - flore pallido, purpureo.

CROCI verni diueríae species, flore albo, luteo, coeruleo, et violaceo.

CRVCIATA, hirfuta flore luteo.

- - alpina latifolia laeuis. 🔫

CVCVBALVSPlinii.

CVCVLIFlos, Roseus; Lychnis pratenfis, flore laciniato.

- Flos, plenus, purpureus; Lychnis.

- Flos, albus; Lychnis.

- - Flos, plenus, albus; Lychnis,

CYANV smontanus, latifolius, maior.

CYMBALARIA.

CYNOGLOSSVM montanum maxi-

- - maius, vulgare, flore rubrò.

- - maius, vulgare, flore albo, monta-

- medium, Apulum, argenteum, campestre; Creticum.

Orientale, Buglossi folio, semine vmbilicato, cristato.

CYPEROIDES maius angustifolium.
- - angustifolium spicis longis erectis C.

B. P.

CYPERVS, rotundus, angustifolius, esculentus.

- - rotundus, inodorus, Germanicus.

D.
ENSCANIS, flore rubro.

- - flore carneo.

- - florealbo.

DENS LEONIS; Taraxacum.

-. - qui Pilosella maior, repens, hirsuta.

- - qui Pilofella maior, repens, minus hirfuta.

DIGITALIS, florerubro.

- - flore albo.

- flore albo, punctis internis, purpureis, maioribus.

- - flore ferrugineo, latifolia.

- - flore luteo, magno.

- flore luteo, minore.

- minima; Gratiola, flore albo.

DIPSACVS, fyluestris, aut virga pastoris maior.

- foliis laciniatis.

DORIA; Solidago Saracenica; Virga au-

- - quae Iacobaea palustris.

DORONICVM, quod Arnica.

- radice Scorpii.

- - alpinum minus.

DRACO herba; Dracunculus esculendus, hortensis.

DRACVNCVLVS.

DRYMOPOGON: Vlmaria foliis in longas spicas congestis.

Есні-

E.

ECHINOPUS; Carduus Sphaeroce-

ECHIVM, Scorpioides, flore coeruleo maiore.

ELICHRYSVM, vel Stoechas citrina.

- - Americanum, latifolium; Gnapha-

- flore suauerubente.

- - montanum folio rotundiore candido.

EMPETRVM, fructu nigro; Erica Coris

EPHEMER v M, Virginianum, flore coeruleo; Ephemerum phalangoides.

EPIMEDIVM.

EQVISET VM, palustre, breuioribus se-

- - pratenfe.

ERICA, flore rubro.

ERVCA lutea latifolia fiue Barbaraea C. B. P.

- fiue Barbaraea minor. Sifymbrium Erucae folio glabro minus et praecocius T.

ERYNGIVM, campestre, vulgare.

- montanum, latifolium, florealbo.

- - montanum amethystinum.

EVPATORIVM, vrticae folio.

· vulgare.

PERRVM Equinum, comolum, flore

FICARIA, quae Chelidonium minus.

- florepleno. WAR

FILIPENDULA.

FILIX, ramola, quae foemina.

- - non ramofa, mas.

- - petraea; Dryopteris, and

FOENICVLVM, dulce.

FRAGARIA, flore albo.

- - sterilis, syluestris,

FRAXINELLA; Dictamnus albus.

- - flore pallente, folio angusto, minore; minor, flore albo.

FVMARIA, bulbosa radice, caua, maior, flore purpureo; Pseudo-fumaria.

- bulbofaradice, flore albo.

- - radice non caua, flore purpureo.

- radice non caua, flore albo.

GALEGA, flore coeruleo.

- flore albo.

Africana, floribus coeruleis, maioribus, filiquis crassioribus.

GALEOPSIS, flore luteo, foliis maculatis; Lamium,

GALLIVM, flore luteo.

- - flore albo.

GENTIANA, cruciata.

- - palustris, aurumnalis; Pneumonanthe dicta

GEN-

GENTIANA palustris, lato plantaginis folio, flore coeruleo, punctato.

GERANIVM, batrachioides, flore violaceo.

- - batrachioides, flore albo.

- - batrachioides, odoratum, flore roseo.

- - batrachioides, folio Aconiti.

- - haematodes, supinum, radice reptante.
- phaeum, petalis planis, fuscum, pullo flore.
- - Robertianum, murale, graueolens.

. . . flore albo.

- Lancastrense,

- - petalis planis flore nigro.

- - Aconiti folio floribus longiori pe-

- Graueolens moschatum.

GEVM, folio rotundo, dentato; Vmbilicus Veneris; Sanicula montana, folio rotundo.

- folio rotundo, dentato, striis aureis

interdistincto.

 folio subrotundo, minori dentato, pistillo sloris rubro,

GLADIOLVS, flore purpureo.

- - Flore albo, aliaeque species.

GLAVCIVM, Flore luteo; Papauer corniculatum. GLAVX, maritima, Myrti Tarentinae fo-

GLOBVLARIA, Scabiosa minor.

GLYCYRRHIZA.

- - echinato capite;Pseudo-Glycyrrhiza.

GRAMEN, paniculatum, folio variegato, arundinaceum.

- - dactylon Orientale.

- Gras Belgarum.

GRAMINVM fyluestres variae species. H.

HEDYSARVM, clypeatum, flore elegantissimo, rubro.

- - clypeatum, Flore albido.

- Ganadense.

HELIANTHEMVM.

HELLEB ORINE, latifolia, barbarubra.

HELLEBOROIDES.

HELLEBOR O-RANVNCVLVS, Flore globoso, luteo; Trollius ranunculus.

HELLEBORVS, niger, foetidus; Helleborastrum magnum.

 - hortenfis, maior, Flore viridi; Elleborum nigrum.

- - hortenfis, minor, Flore viridi.

- - Flore albo, vel roseo;

- - Flore roseo.

HEPATICA, Flore coeruleo.

- - pleno coeruleo.

- - trifolia, Flore coeruleo pleno.

- - Flore rubro.

HEPA-

HEPATICA, Flore rubro fimplici.

- Flore albo fimplici;

HERNIARIA.

HESPERIS, hortenfis, Flore purpureo, fimplici.

- hortenfis, Flore purpureo, plenoz

- - hortensis, florealbo, pleno.

 quae viola matronalis, flore albo, et purpureo, pleno, variegata.

- montana, flore obfolero, noctu olens.

- - Allium redolens; Alliaria.

- quae Draba, flore albo.

HIERACIVM, Alpinum, latifolium,

- fruticosum, angustifolium.

- - murorum ; Pilofella aliorum maior; Pulmonaria Gallorum.

- - hortense, floribus atro - rubentibus; Pilosella flammea, maior Syriaca.

- - vmbelliferum; Pilofella maior, ere-

- - Hirfutum vmbelliferum maius.

- Hirfutum, Pilofella ramofa.

HORMINVM, Spurium; Gallitrichum,

- foliis alatis, hirfutis, caule, et caliculis

- - verbenae laciniis.

- - Floribus ex albidis.

- flore coeruleo.

HOTTONIA; Myriophyllum aquaticum.

HYA-

HYACINTHYS, stellatus, coeruleus, amoenus.

- - Belgicus, flore carneo

HYDROCOTYLE; Cotyledon aquaticus, acris septentrionalium.

HYDROPHYLLON; Dentariae affinis. Hypericvm, vulgare.

- - elegantissimum, non ramosum, folio punctato in margine.

- minimum, supinum, glabrum.

Hyssorvs, flore coeruleo.

- - flore albo.

- flore carneo.

۲.

I A CE A, capite spinoso, folio multisido, flore luteo.

- - Laciniata, Sonchi folio, capite spinoso, flore purpureo.

- nigra, pratenfis, latifolia.

- - purpurea, capite villoso, aspero; Cyanus, capite reticulato.

- flore purpureo, montana, maior, fo-

IACOBAEA, Sicula, facie Chrysanthemi. IMPERATORIA.

IRIS Dalmatica maior flore, vulgari minus violaceo I.B.

- - humilis minor, flore purpureo barba violacea.

- - graminifolia flore pallide coeruleo.

- - flore atropurpureo.

TRIS

IRIS flore purpureo flauescente.

- - hortenfis corona pallide coerulea, barba purpurea firiata

- humilis flore candido, Florentina di-

Eta.

- - latissimo glauco folio flore luteo, barba albida.
- - humilis flore saturate violaceo.
- Latifolia flore coeruleo.
- flore albo barba coerulea.
- - hortenfis flore obfoleto, barba coerulea.
  - angustifolia flore purpureo.

- - hortenfis verficolor.

- - maior Latifolia, surrectis foliis floris flauis & purpureis lineis distinctis.

- hortenfis alba Germanica C. B.P.

- - media, longissimis foliis lutea.

- - latissimo glauco folio flore toto pallide coeruleo.

- - media foliis in flore surrectis albis barba coerulea albo striata.

L.
AMIVM, flore albo, non foetens.

- Flore purpureo, non foetens.

- Flore carneo.

LAPATHVM montanum, folio rotundo neruis foliorum rubescentibus.

-- vnetuosum bonus Henricus.

- - Alpinum, folio subrotundo.

- - hortense, folio oblongo.

LAPATH V M aquaticum, folio cubitali, Lapathum palustre.

- hortense, folio magno, lato, subro-

tundo.

- folio acuto, plano, siue Oxy-Laparhum.

- - folio acuto, crispo.

- - acutum neruis folii rubentibus.

- - minimum; Hydro-Lapathum, minus.

- folio superioriacuto, rubente.

LAPPA, quae Bardana maior.

LASERPITIM, Latifolium.

- - tenuifolium.

LATHYRVS, Narbonensis, Latifolius.

 maiori flore, ex roseo violaceo; syluaticus.

- Aruenfis.

- - pratensis, flore luteo.

LAVENDULA, Latifolia.

- - angustifolia.

LEPIDIVM, Piperitis.

folio magis lerrato.

- glastifolium.

LEVCANTHEMVM; Buphthalmus aliorum; Bellis maior.

Tanaceti folio, semine vmbilicato;
 Bellis Tanaceti folio.

LEVCOIVM; Keiri, cuius species vid. in Cat. Flor.

LIBANOTIS.

LIGVSTICVM, apii folio, vulgare; Leuisticum.

LILIO-ASPHODALVS, luteus.

- - puniceus:

LILIO-FRITILLARIA; Lilium Perficum, aut Susianum.

LILIO - N AR CISS V S, Luteus, autumnalis, minor; Narcillus ferotinus.

LILIVM, album.

- folio inargentato.

- album, flore pleno:

- - purpureo-croceum; Hemerocallis.

- - floribus reflexis, pallide purpurascentibus, punctatis; Martagon vulgare.

 quod Martagon Constantinopolitanum, flore luteo; Hemerocallis.

- - Byzantinum, miniatum.

LINARIA, Latifolia, Dalmatica, luteo, magno flore.

- odorata, flore, ex coeruleo, purpureo,

minore.

- - vulgaris, flore maiore.

- - flore pallido, luteo, minore, rictuaureo, Pannonica.

- - flore albo.

- flore, ex coeruleo, et albo variegato, minore.

- flore paruo, fere toto coerulescente, calcari breuiore.

LINOSYRIS: Passerina Tragi.

LIN-

LINGVA CERVINA; Phyllitis, vel fcolopendrium.

angustifolia, lucida, folio ferrato; Hemionitis maior, crispa.

- multifido folio.

- - quae Phyllitis vndulata.

LITHOSPERMVM, perenne.

LOTVS, tetragonolobus, flore luteo.

- .- flore maiore, luteo, aruenfis.

LVNARIA, maior, siliqua rotundiore, florealbo.

- - flore coeruleo.

LVPVLVS, mas,

- - foemina.

LYCHNIS, coronaria, flore purpureo.

- - coronaria, flore rubro pleno.

- coronaria, flore albo.

- hirfuta, Chalcedonica, flore coccineo,

- hirfuta, Chalcedonica, flore incarnato, maior.

- hirfuta, Chalcedonica, flore candido,

- hirfuta, Chalcedonica, flore pleno,

- alba, multiplex.

- fyluestris, alba, simplex.

- fyluestris, purpurea, simplex.

- - purpurea, multiplex, aliorum Ocymastrum.

- Ocymastri facie flore viridi.

LYCH-

LYCHNIS, fyluestris, quae Been album.

- - fyluestris, quae Been album, flore albo, pleno.

- - Suecica, calyce rotundo, amplissimo.

- - syluestris, quae Saponaria.

- - quae Saponaria, flore pleno.

- - syluestris, viscosa, rubra, angustifolia.

- - Íyluestris, viscosa, rubra, flore pleno.

- folio inferiori Bellidis, hirfuta, flore carneo; an noctiflora Dubracenfis.

LYCOPODIVM.

LYCOPVS.

- - folio tenuiter secto.

LYSIMACHIA, lutea, maior, quadrifo-

- - bifolia, aut trifolia; Blattariae affinis.

- - Ialappae folio.

- - angustifolia.

M.
AIORANA, perennis.

MALVA rosea folio subrotundo store puniceo simplici et pleno.

- rosea folio subrotundo slore carneo

fimplici et pleno.

- rosea folio subrotundo flore purpureo relucente simplici et pleno.

- rosea folio subrotundo flore albo fundo purpureo simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo slore ex rubro nigricante simplici et pleno.

MAL-

MALVA rosea folio subrotundo slore purpurascente simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo flore roseo.

 rosea folio subrotundo slore slauo fundo carneo.

- - rosea folio subrotundo flore albo fundo carneo.

- - rosea folio subrotundo flore luteo simplici et pleno.

- - rosea folio subrotundo slore albo

simplici et pleno.

MARRVBIVM, album, vulgare.

- - angustifolium.

- - Hispanicum candidum.

- - folio amplissimo.

MATRICARIA, flore simplici.

- - disco nudo.

- - flore simplici fistuloso.

- - disco fistuloso.

- - flore pleno.

MEDICA, maior, falcata, flore purpuroviolaceo; Foenum Burgundicum.

- - eadem foliis minoribus, flore exviridi, et violaceo variegato.

- - falcata, maior, flore luteo.

MELILOTVS, fruticosa, lutea.

- - fruticofa, candida.

MELISSA, vulgaris.

- - Romana molliter hirfuta, et graucolens.

- - humilis, latifolia, maximo flore pur-

purpurascente; Melissophyllum. MENIANTHES; Trifolium sibrinum. MENISPERMVM.

MENTHA, crispa.

- - crispa, folio, ex aureo, et viridi varie-

- - verticillata, latifolia, neque crispa.

- - folio angustiore, verticillata.

- - Aruensis, verticillata, hirsuta; Calaj mintha.

- - palustris, spicata.

MENTHASTRVM, Anglicum, niueum
- Anglicum, foliis viridibus.

MERCVRIALIS, perennis; Cynocramibe, foemina.

MEVM.

MILLEFOLIVM, flore purpurascente.

- - florealbo.

- - flore pallido.

- - vulgare, maius, album, foliis eleganter variegatis.

MOLLVGO, latifolia, montana, ramofa, MOLY, Latifolium, Liliflorum,

MOSCHATELLINA; Ranunculus.

MVSCARI, obsoletione flore, odoratissimo; Bulbus vomitorius.

- - flauo flore; Tibcadi.

- - coeruleum, maius; Hyacinthus, arbuteo flore, coeruleo.

MYRRHIS, tuberosa, semine minore, striato, leui; bulbosa,

2

Myr-

MyRRHIS, odorata.

- - trilobata, Canadensis.

- - Podagrariae folio.

MYOSOTIS repens.

MYRTILLVS.

- - fructu rubro; Vaccinia rubra.

- - fructu albo; Vaccinium.

N

N ARCISSO-LEVCOIVM; Leucoium bulbosum, triphyllum.

- - quod Leucoium bulbolum, vulgare, hexaphyllum.

- - hexaphyllum, polyanthos.

- - hexaphyllum flore pleno.

NARCISSI diuerfi, folio lato, flore, in fastigio caulis, vno plerumque.

- - folio lato, fastigio caulis ferente plures slores.

- - folio angusto Iunci. Vid. Catal. Flor.

NVMMVLARIA, repens.

NYMPHAEA, florealbo.

- - maior.

- - alba, minima, quae morsus ranae.

0.

OENANTHE, triflora, aquatica, caulibus fistulosis.

OMPHALODES, Latifolia; Borrago minima.

ONAGRA, Latifolia.

ONO-

ONOBRYCHIS, maior, filiculis echinatis, cristatis.

- - filiculis, aculeis maioribus donatis.

OPHIOGLOSSVM.

OPHRYS, vel bifolium.

ORCHIS, vulgaris, flore purpureo.

- - vulgaris, flore albo, barba albicante.

- - spica purpurea, foetida.

- - spiralis.

OREOSELINVM, maius, Apii folio; Ceruaria.

- - minus, Apii folio.

ORIGANVM, vulgare, maius.

 vulgare, minus, foliis, exargenteo, variegatis, floribus pallidis, rubris.

ORNITHOGALVM, flore coeruleo, Hyacinthus stellatus.

- - Latifolium et maximum C. B. P.

- - angustifolium spicatum maximum.

- floribus ex albo virescentibus.

- - fpicatum album.

- - bifolium gramineum coeruleum.

- - vmbellatum album medium latifolium C.B.P.

- - coeruleum Lusitanicum Latifolium Hyacinthus Peruuianus.

- - Luteum.

OROBVS, Sylvaticus, flore purpureo.

- - Viciae folio.

OSMVNDA Lunato folio; Lunaria botrydės,

E 3 OTI-

OTITES.

Oxycocvs; Vaccinia palustris.

Oxys, flore albo.

- flore Luteo; Trifolium acetosum.

- flore rubello.

PALMATA, ORCHIS, florealbo, folio maculato, viridi: Palmata.

- flore diluto, purpureo, angusto folio maculato, obseuro.

PAPAVER, hirfutiffmum, Orientale, flore maximo, puniceo.

PARIETARIA.

PARIS.

PARNASSIA; Gramen Parnassi.

PASTINA CA, Syluestris.

- fatiua.

PENTAPHYLLOIDES, flore rubro, palustre; Pentaphyllum.

- argenteum; Potentilla, vel Anserina.

- - fupinum.

PERFOLIATA, montana, Latifolia.

- montana rugosiore folio.

PERSICARIA, vulgaris, non maculofa.

maculofa.

- - vrens; Hydropiper.

PERVINCA, vulgaris, angustifolia, flore fimplici, coerulescente.

- vulgaris, angustifolia, flore albo.

- vulgaris, angustifolia, flore pleno, rubro, coerulescente; Daphnoides.

PER-

PERVINCA, vulgaris, angustifolia, variegata exargenteo et viridi.

PETASITES, maior, florerubro.

- - maior, flore albo.

- - minor, tuffilaginis anguloso folio.

PEVCEDANVM.

PHALANGIVM, non ramofum.

- - ramosum, maius, flore candido.

PHELLANDRIVM.

PHYTOLACCA, Americana, fructu maiore; Amaranthus baccifer, aut Solanum racemosum, magnum, Virginianum, flore albo.

PIMPINELLA, spica breui, rubra; Pimpinella, siue Sanguisorba maior.

- Sanguilorba Italica, foliis glabris;
Pimpinella odore cucumeris.

- Agrimonoides, odorata.

PLANTAGO, maior, Latifolia.

- - Latifolia, media.

- - Lato, sanguineo folio.

- maior, angustifolia.

POEONIA, mas.

- - foemina.

- - mas, flore albo.

- - Folio maxime laciniato, Flore Kermefino, fimplici.

- foemina, flore pleno, rubro, maiore.

 Tenuifolia, caesia; slore pleno, ex petalis latioribus, et angustioribus permistis, rubro. POLEMONIVM, flore coeruleo: Valeriana Graeca.

flore albo.

POLYGALA, frutescens, folio buxi, flore maximo.

POLYGONATVM; Sigillum Salomonis Latifolium, vulgare.

maximum.

- flore pleno.

- angustifolium, non ramosum.

- folio Veratri.

- non ramofum.

POLYPODIVM.

POPVLAGO; Caltha palustris.

- flore pleno.

PORRVM, commune capitatum.

POTAMOGETON, Latifolium.

- Longo, serrato folio.

PRIMVLA VERIS, vmbellata, odorata, pratenfis, flore luteo.

vmbellata, pallido flore, elatior, pra-

tenfis.

geminato flore, Aurantio.

Anglicana, flore luteo, pleno.

- hortensis, vmbellata, caule, et flore coccineo, folioso. Aliaèque species.

PSYLLIVM, maius, supinum, angustifolium, perenne.

PTARMICA, vulgaris. flore pleno.

PVLEGIVM, vulgare.

PVLEGIVM, angustifolium, ceruinum, Citri odore.

PVLMONARIA, folio maculato, argenteo.

- Vulgaris, latifolia, folio maculato, et non maculato.

- - folio longiore, non maculato, flore eleganti, e rubente coeruleo.

- - flore albo.

PVLSATILLA, tenuiore folio.

PYROLA.

Q.

QVINQVEFOLIVM, rectum luteum maius; Pentaphyllum.

- - maius, repens, Flore luteo.

- - rectum, caule rubro, hirfutius.

- erectum, folio subtus argenteo.

- - minus, repens, vulgare.

- - minus, repens, luteum, flore tetrapetalo; Tormentilla.

- flore albo, montanum.

R.

RANVNCVLVS, pratensis, erectus, acris.

- - pratenfis,in foliis medio notatus macula nigra.

- pratenfis, erectus, dulcis.

- - pratensis, repens, hirsutus.

- - hortenfis, inclinans, flore pleno.

- - magnus, valde hirsutus, flore luted.

E 5

RA-

RANVNCVLVS montanus, Aconiti folio, albus, flore minore.

- - folio Aconiti, flore albo, multiplici.

 pratenfis, radice verticilli modo rotunda.

- - bulbofus, flore pleno.

- - nemorosus, vel syluáticus, folio subrotundo.

- - rutae folio, flore pleno.

- - aquaticus, folio rotundo, et capil-

- - aquaticus, capillaceus.

--- aquatilis, albus, fluitans, Peucedani folio.

- - Longifolius, palustris, maior.

- Longifolius, palustris minor.

 plantaginis folio Tournef, seu plantago aquatica.

- - montanus folio incano illyricus.

hortenfis, et eius diuerfae species.
 Vid, Cat. Flor.

RAPVNCVLVS, corniculatus, flore albo.

 corniculatus, capite globoso, coeruleo.

RESEDA, maxima.

RyBIA, tin ctorum, fatiua.

- - fyluestris, Monspessulana, maior.

RVBEOLA, syluestris, quadrifolia, aspera. -- quadrifolia, laeuis, slorealbo; Rubia.

Rvscvs myrti folio aculeatus.

Rvscvs Laurus alexandrina longifolia. Rvта, latifolia.

S.
SAGITTA latifolia, maior.
SALICARIA; Lysimachia purpurea spicata.

SALVIA, vulgaris latifolia.

- - maior, folio, ex luteo, et viridi varie-
- - Latifolia crispa.
- - minor aurita et non aurita.
- - flore albo.
- - carneo.
- - foliis angustissimis.

### SANICVLA.

SAXIFRAGA, alba, capsula bicorni.

- - Sedi folio angusto, serrato; Sedum.
- - foliis subrotundis, serratis.
- - foliis ferratis in angulum acutum definentibus.

SCABIOSA, Alpina, folio Centaurii maioris, flore luteolo.

- - pratensis, hirsuta.

- - fulphurea perennis.

- glabra, integro folio; Succifa.

- - flore cinereo, capitulo globoso, foliis in tenuissimas lacinias diuiss.

SCLAREA, maxima, vulgaris, flore coerulescente.

SCLAREA, Aethiopica, Lanuginosa, incana, laciniato folio, flore albo.

- - glutinosa, flore luteo, quae Colus Iouis.

- - pratenfis, foliis serratis, flore albo; Saluia agrestis.

quaeHorminum (yluestre, maius, florealbo, foliis integris,

- - pratenfis, foliis serratis, flore coeruleo; Horminum.

- - pratenfis, flore suauerubente.

SCORDIVM.

SCORODOTIS, quae Saluia agrestis; Scorodonia.

SCORZONERA, latifolia, finuata, hispanica.

- - latifolia, humilis, neruola, pannonica.

SCROPHVLARIA, nodola, foetida, flore atro-purpureo, punicante, folio obscuriore.

- - Pyraenaica vrticae folio.

- Verbenae folio.

- - Betonicae folio.

- Sambuci folio.

- - radice fibrosa; Betonica aquatica.

- Melissae, aut Scorodoniae folio.

SED v M, maius, vulgare.

- - tomentosum.

- minus, luteum, Tamarisci folio.

- - teretifolium, esculentum; Semperuiuum,

SE-

SEDVM, paruum, acre; Semperuiuum vermiculatum.

- - minus, vermiculare, nec acre.

SERPILLVM, vulgare, maius.

- folio variegato.

- odore Citri.

- - longiori, et tenuiori folio, syluestre; Zygis,

SERRATVLA, foliis minus profunde fe-

- - foliis profunde sectis.

SIDERITIS, vulgaris, hirsuta, erecta, flore luteolo, galeae inferioris limbo purpureo.

SILAVM; Šeseli pratense.
- - quod Angelica pratensis.

SISARVM.

S1SYMBRIVM, aquaticum; Nasturtium humile, aquaticum.

- Orientale, facile Barbareae; folio

Plantaginis.

- Erucae folio, glabro; Barbarea maior.

- Erucae folio, glubro, vel Barbarea

- quod Rapistrum aquaticum.

- - repens, folio Nasturtii, slore luteo; Eruca.

SIVM, Latifolium, maximum.

- - aquaticum, foliis multifidis, longis, ferratis; Cicutaria.

SIVM

SIVM, minus.

- - aromaticum; Sison.

SMILAX, laeuis Monophylla.

SOLANVM, lignosum, scandens; Dulcamara; Vitis syluestris.

- - tuberosum, esculentum; Arachidna.

- - tuberosum radice alba.

SONCH VS, hieracites, asper.

SPARGANIVM, ramofum.

SPHONDYLIVM; Branca vrfina.

SQVAMARIA Riuini: Anblatum T.

STACHYS, montana, lanuginosa.

- - palustris, angustifolia.

- foetida, latifolia, syluestris.

STATICE, Latifolia.

STELLARIA aquatica.

SYMPHYTVM, flore rubro.

- florealbo.

- - flore ferrugineo.

T.
ANACETVM, vulgare.

- folio crispo.

THALICTRVM, Canadense, caule purpurascente, staminibus albis.

- - Canadense.

 maius, florum staminibus purpurascentibus; Thali&rum flore incarnato.

 montanum caulibus petalorum puniceis.

- - pratense latiore folio.

THA-

THALICTRVM Alpinum maius aquilegiae folio florum staminibus albis caule viridi.

- - aquilegiae folio florum staminibus

purpureis.

- aquilegiae folio florum staminibus viridibus.

- - maius filiqua angulosa: Thalittrum florealbo.

- - folio glauco.

- - pratense Rorismarini angusto folio.

- - humile.

- , - flore magno.

THYMVS.

THYSSELINVM.

TITHYMALVS; Cataputia.

- Latifolius, an Characias.

- palustris, fruticosus.

- - Helioscopius; Esula Solisequa.

- Pini, vel potius Linariae folio.

- cypariffias, repens.

TRAGOPOGON, pratense luteum minus.

- - purpureo-coeruleum, Porri folio.

TRAGOSELINVM, maius, v mbella candida.

- maius, coeruleum.

- minus; Pimpinella saxifraga, vulgaris Pimpinellae folio, minor.

- - quod Pimpinella, minor.

#### TRICHOMANES.

TRIFOLIVM, montanum, spica longiore, rubente.

- - pratense, purpureum.

- album.

Tuliparum praecocium et ferotinarum plures species. vid. Cat. Flor

TVRRITIS, foliis inferioribus cichoraceis, hispidis; Brassica syluestris.

TVSSILAGO, vulgaris.

- - folio Terrato.

- - Rotundifolia minor montana alpina.

# V. ALERIANA, hortensis latifolia.

- - folio vario.

- angustifolia.

- - palustris, minor; Phu minus.

- - marina, flore purpureo.

- - marina, flore albo.

VERATRVM, vel Helleborus albus.

VERBASCVM, magnum, latifolium luteum.

 mas dictum, angustioribus foliis, floribus pallidis.

- - Lychnitis, flore albo, paruo.

nigrum, crispo, et sinuato folio, flore luteo.

- - nigrum, staminibus, in luteo store, purpureis.

VERBENA, Americana, altissima, Vrticae foliis foliis angustioribus, spicis breuioribus, sloribus coeruleis.

- - Americana, Vrticae folio, floribus albidis.

- - vulgaris.

VERONICA maior latifolia, erecta.

- - spicata; longisolia spicata.

- - montana.

- - montana, angustifolia, minor.

- - mas, supina, et vulgatissima; Veronica,

- maior, frutescens, altera; Veronica pratensis latifolia.

- - aquatica, maior, folio subrotundo: Beccabunga dicta.

 - aquatica, minor, folio subrotundo; Beccabunga minor.

VICIA, perennis, acutiori folio; Vicia fepium.

VIOLA, flore coeruleo.

- - martia multiplici flore striato.

- - - - purpureo.

- - Aore coeruleo, pleno.

- fore coeruleo, medio rubro.

- - flore albo.

- - Martia, inodora, syluestris.

- - montaña, lutea, grandiflora.

VIRGAAVREA, latifolia, flore minore.

- Canadensis Vrticae folio.

- Latifolia, flosculis minimis.

VIRGAAVREA, angustifolia, panicula speciola, Canadensis, flosculis minimis.

angustifolia, minus ferrata.

Mexicana, Limonii folio, floribus vno versu dispositis; panicula laxiore er foliis minus crenatis.

VLMARIA, pratensis.

VVVLARIA.

VRTICA, vrens, maxima.

VVLNERARIA, rustica; Anthyllis leguminosa, flore luteo.

Y.

Yvcca, foliis Aloes.



# ARBORVM

E 7

### FRVTICV M SYLVESTRIVM.

A.

A BIES, taxi folio, fructu sursum spectante; Abies altera.

- - tenuiore folio, fructu deorsum spechante; Picea.

ACER, maius, montanum.

- - alterum, Platani folio,

- - minus, campestre.

ALNVS.

AMYGDALVS.

- - amara.

- Indica, nana aliaeque species.

AQVIFOLIVM, seu Agrifolium, ARMENIACA.

N 5 15 1 ...

B.

Berberis dumetorum.

BETVLA.

BIGNONIA, Americana, fraxini folio, flore amplo, phoeniceo; Gelseminum clematites. Bvxvs, humilis.

- - arborescens.

C

CAPRIFOLIVM; Periclymenum non perfoliatum, Germanicum.

- İtalicum, perfoliatum.

- - Germanicum, flore rubello.

CARPINVS.

CASTANEA, maiore fructu, satiua,

- - fyluestris, minore fructu.

CERASVS, vel Cerasia.

- - flore pleno.

- - pumila.

- - racemosa; Padus.

CHAMABCERASVS, Alpina, fructu gemino, rubro, duobus punctis notato; Xylosteum, folio cerasi maiore.

- - Alpina, fructu gemino, nigro.

dumetorum, fructugemino, rubro;
 Xylosteum.

COLVTEA, vulgaris, flore puniceo.

- flore phoeniceo.

CORNVS, mas.

- - foemina, Ossea dicta; Virga Sangui-

CORYLVS, satiua.

- - fyluestris; Nux Auellana.

- - Byzantina, altissima, et maxima.

CRATAEGVS, folio subrotundo; Mespilus, Alni effigie, Lanato folio, maior.

CRA-

CRATAEGVS, Folio laciniato; Sorbus

CYDONIA, fructu maiore; - Cotonca

- - fructuminore; Cotonea malus.

- - angustifolia, vulgaris.

CYTISO-GENISTA, Scoparia dista.

CYTISVS, Alpinus, latifolius, flore racemolo; Anagyris non foetida; Laburnum trifoliatum.

- - montanus, glaber, nigricans, flore luteo.

E.

E LAEAGNUS, angustifolius, fructu

EMERVS; Colutea Scorpioides, elatior. ERICA, flore rubro.

EVONYMVS.

F.

HAGVS.

FRANGVLA.

FRAXINVS.

- frugifera, foemina, floribus in linguam auis excrescentibus.

Mis G.

GENISTA, tinctoria; Genistella non spinosa.

- - vulgaris.

IGENISTA SPARTIVM, maius, longioribus aculeis; Scorpius.

- Spartium; Genistella spinosa.

GROSSVLARIA, satiua; Vua spina.

- spinosa, fructu obscure purpurascente aliaeque species.

H. EDERA, arborea. - minor, quae Helix. HIPPOCASTANVM.

SMINVM luteum. IVNIPERVS, vulgaris, fruticola. · vulgaris, arbor.

IGVSTRVM. - folio variegato.

LILAC, flore coeruleo; Syringa coerulea, vulgaris; Lilac.

flore albo.

folio Ligustri, flore coeruleo; Lilac Perfarum.

M. NALVS, hortenfis. - Syluestris.

MESPILVS, Germanica, vulgaris.

folio laurino, maior.

MESPILVS, Apii folio, syluestris; Oxyacantha; Spina acuta.

- - : spinosa; Oxyacantha, flore pleno.

- - folio subrotundo, fructu rubro; Chamaemespilus.

Morvs, fructu nigro.

- - alba.

VX IVGLANS.

- - flore globolo; Sambucus aquatica, polyanthos.

Ρ.

PENTAPHYLLOIDES, rectum, fruticofum, flore luteo, Eboracenfe. PERSICA, viridis, et alba.

- - flore pleno.

PHILADELPHVS; Syringa.

PINVS, Syluestris.

- - humilis, iulo purpurascente; Pinaster.

PLATANVS.

POPVLVS, alba.

- - nigra.

- - tremula, Lybica.

PRVNVS, vel pruneolus, aut Acacia spuria.

- hortenfis, flore pleno.

F 4

PRV-

PRVNVS, hortenfis, flore fimplici, et eius diuersae species.

PSEVDO-ACACIA, filiquis glabris. Pyrvs, hortenfis.

- fyluestris.

- flore pleno aliaeque species.

- Castaneae folio.

VERCUS.

R HAMNUS, catharcticus; Spina infe-ctoria.

RHVS, Virginianum, vel Sumach.

RIBES Syluestris fructuacido minore.

bacca rubra.

- bacca alba.

- minor, fructurubro.

- bacca nigra.

ROSA, Lutea, simplex.

- Lutea, multiplex.

- Damascena.

- campestris, spinosissima, slorealbo, odoro.

- campestris, spinosissima, flore ex albo et suauerubente variegato odoro.

· - alba, flore pleno.

- - rubra, multiplex. - - Prouincialis, flore incarnato, pleno.

- - rubicunda, Saccharina dicta.

- - flore, ex rubro, nigricante, pleno.

- - flore magno, pleno, ex atro rubente

et pallide rubro variegato, ocyssime marcescente.

Rosa praenestina, variegata, plena.

- fyluestris, incarnato flore.

- - multiplex, media, centifolia.

- - Prouincialis, flore pleno, atro-purpureo.

R v B v s, vulgaris, fructu nigro.

- - repens, fructu caesio.

- - Idaeus, fructu albo.

- - Idaeus, fru&turub.o.

S.

SABINA, folio Tamarisci, mas di-

- - folio Cypressi.

SALIX, alba, arborescens.

- - Lutea, satiua, folio crenato.

- - humilis, repens.

- - palustris.

- vulgaris.

- - angustifolia.

SAMBUCUS, vulgaris.

- - fructu albo.

- - racemola, fructu rubro.

- - Laciniato folio.

- - humilis; Ebulus.

SOLANV M, lignosum, scandens; Dulcamara; Vitis syluestris.

SORBVS, domestica.

- Aucuparia.

SPIRAEA.

 - Hypericonis folio, non crenato; Hypericum arborescens.

STAPHYLODENDRON; Pistacia.

- - fyluestris.

AXVS.

THVYA; arbor vitae.

THYMELAEA germanica, Lauri folio, deciduo, flore purpureo; Laureola.

T.

TILIA, foemina.

- - mas.

TOXICODENDRON, triphyllum, glabrum; Vitis canadenfis trifolia.

 folio finuato, magis glabro, ceteroquin fimile praecedenti.

V. VIBVRNVM. VITIS Canadensis quinquefolia. VLMVS.

X.
YLOSTEVM bacca duplici.
- - fructu cerafi.



### CLASSIS QVARTA

# PLANTARVM.

### A.

## ABVTILON.

- - Americanum, reptans, flore giluo;

ACETOSA, Americana, foliorum longissimis pediculis; Acetosa vesicaria.

- Ocymi folio, Neapolitana.

ACINOS; Clinopodium aruenfe, Ocymi facie.

ACRIVIOLA, maxima, odorata, slore Aurantio.

- - flore fulphureo.

- - Aore paruo.

ADONIS, hortensis, flore minore, atro rubente.

- - fyluestris, flore phoeniceo, folio lon-

AGERATUM, laciniatis foliis, inodorum, Africanum; Elichrysum inodorum glabrum. ALCEA, flore albo, moschato, maiori.

ALCHIMILLA supina gramineo folio.

ALKEKENGI, Indicum, maius; Solanum Halicacabum Indicum.

- Indicum, minimum, fructu virescen-

te.

Indicum, glabrum, capfici folio, calyce, quinque striis ex nigro purpureis, in angulis notato.

- Americanum maximum villosum.

ALSINE, minor, multicaulis.

- - petalis quinque integris, equiseti folio; Spergula maior.

- tetrapetalos, minima, glabra, Alfinel-

la.

- - tetrapetalos, verna, glabra.

 verna, glabra, floribus vmbellatis, albis, petalis bis incifis.

ALYSSVM vulgare, Polygoni folio, caule nudo; Burla paltoris, loculo oblongo.

- segetum, foliis auriculatis, acutis;

Myagrum fatiuum.

- segetum, foliis auriculatis, fructu maiore; Myagrum.

AMARANTHOIDES, Lychnidis folio, capitulis purpureis.

- Lychnidis folio, capitulis argenteis,

maioribus.

AMARANTHUS, maximus, spicatus, flore

flore rubro, folio obscuriore, purpurascentibus maculis, semine nigro; Blitum Indicum.

AMARANTHUS simplici Panicula, to-

tus purpureus.

- - maximus, paniculis longis, nodosis propendentibus, rubris, semine rubello.

- fyluestris Nouae Angliae, totus viridis, spica densa.
- - maximus, spica herbida, laxa.
- Indicus, spinosus, spica herbacea.
- - Indicus, spinosus, spica et caulibus subinde purpurascentibus.
- - cristatus flore rubicundissimo.
- - cristatus colore purpureo.
  - cristatus colore Kermesino.
  - cristatus colore aureo.
  - cristatus colore luteo.
- - cristatus colore ex rubro et luteo vario.
- cristatus flore rubro.
- - cristatus, colore coccineo.
- cristatus, colore luteo.
- - fpicis carneis, interfusa flauedine micantibus.
- - spicatus sericeus luteo virescens.
- - spicatus flammeo colore lucens.
- - spicatus aeneo colore simul et carneo varius.

AMARANTH VS spicatus aureus et igneus.

- - spicatus, purpureus.

- spicatus, flauescens.

- fpica inclegante viridi.

- - spica inelegante purpurascente.

- - tricolor.

- - tricolor, folio variegato, obscuriore,

AMBROSIA, maritima.

A MMI, maius.

- - foliis plurimum incisis, et non nihil crispis.

ANAGALLIS, flore phoeniceo, mas.

- flore coeruleo, foemina.

- - Hispanica latifolia, flore maiore, coeruleo.

ANCHVSA, angustifolia, procumbens, Lithospermi facie; Echioides, slore albo.

Androsace, vulgaris, latifolia, annua.

ANETHVM, hortense.

ANGURIA, Citrullus dicta; Seminenigricante, carnerubra.

- - femine viridi, carne alba.

ANONIS, purpurea, spicata, alopecuroides, maior.

- - viscosa, spinis carens, lutea, maior, odore hirci; Natrix.

- - viscosa, spinis carens, lutea, minor, nec ita graueolens.

- - filiquis ornithopodii.

ANO.

ANONIS, Americana, folio latiore, fubrotundo, flore luteo, Anil, quod Indigo Guadelopenfium.

- Asiatica, frutescens, floribus luteis, et amplis; Crotolaria Asiatica.

- alopecuroides, pufilla, hirfuta, flore ex albo et rubro colore mixto.

ANTHYLLOIDES.

ANTIRRHINV M, minimum, flore rubente, rictuluteo.

- - Aruense, angustifolium, flore rubro, folio Linariae.

- - minimum, flore albo.

APARINE, aspera, vulgaris.

- -, semine coriandri saccharati.

APHACA.

APIVM, quod Anisam.

APOCYNVM, Americanum; Canadenfe, Cornuti, folio glabriore, flore vmbellato aurantio.

ARGEMON Emexicana; Papauer spinofum, foliis lacteis, flore luteo.

ASPERVGO, vulgaris.

ASPERVLA, Aruenfis, flore coeruleo.

ASTER, Chenopodii folio, flore purpureo, ingenti, fpecioso.

ASTERISC VS, annuus, lustranicus, odoratus; Chrysanthemum conyzoides.

ASTRAGALVS luteus, monspeliacus, procumbens siliqua curua.

ASTRA-

ASTRAGALVS, annuus, angustifolius, flosculis subcoeruleis: stellatus.

- Canadensis, flore viridi, flauescente,

fructu triangulari.

 fupinus, filiquis villosis, glomeratis, hispanicus, filiqua epiglottidis forma slore purpurascente maiore.

- pumilus, siliqua epiglottidis forma,

flore albo.

ATRIPLEX hortenfisalba.

- - hortensis rubra.

- - Syluestris, folio deltoide triangulari finuato.

AVENA, vulgaris, alba.

- - fyluestris, pilosa, aristis recuruis; Festuca.

В.

# BALSAMINE, lutea; Noli me tangere.

- foemina, flore diluto, rubro.

- - foemina, flore candido, simplici.

- - foemina, flore candido, pleno.

- - foemina, flore, partim candido, partim rubro.

- - foemina, flore carneo, fimplici.

- - foemina, flore variegato, pleno.

- - foemina, flore maiore, rubro, specioso, pleno.

BETA, alba.

Bg.

BETA rubra, radice Rapae.

BETONICA maxima, folio Scrophulariae, floribus incarnatis.

BIDENS, vulgaris, foliis tripartito diui-

- - folio non dissecto; Verbesina; Chry-
  - - Canadensis, latifolia, flore luteo, semine latiore.
  - - Americana, Apii folio; Chrylanthe-
  - - Americana, latifolia, semine angusto.
  - - folio subrotundo.

BLATTARIA, folio multifido, flore

BLITVM, maius, album.

- - rubrum, maius.

-- minus, album.

- - quod Amaranthus Graecus, fylueftris, angustifolius.

BORRAGINOIDES.

BORRAGO, flore coeruleo.

- - flore albo.

BRASSICA, capitata, alba.

- - capitata rubra.

- - gongylodes.

- - cauliflora; florida.

- - fimbriata.

- - crifpa, alba, Neapolitana, Brocoli di-Eta.

- - campestris, perfoliara, flore albo.

BRY-

BRYONIA fructu viridi ex albo striato Ceylanica foliis profunde sectis.

BVGLOSSVM, Creticum, fyluestre, slore azureo; Buglossoides, slore minus aperto, solio verrucoso.

 Creticum, variegatum, flore ex albo, et rubro vario, folio verrucis albis

obfito.

BVPHTHALMVM, Creticum, Cotulae facie, flore albo.

BURSAPASTORIS, maior, folio non finuato.

- - maior, folio sinuato.

C

## CALTHA prolifera.

- - seu Calendula, slore simplici, citrino.

- - vulgaris, medio floris ruffo.

- - polyanthos, maior, flore luteo, pleno.
- - Aruensis minor.
- - Aruensis, minor, semine echinato.
- Africana, flore intus albo, extus violaceo; Calendula Africana, humilis.
- Africana, flore intus albo, extus leuiter violaceo, semine pleno, cordato, pediculis pene aphyllis.

CAM-

CAMPANULA, Aruensis, erecta, slore violaceo.

- - Aruensis, erecta, flore albo.

- - pentagonia, perfoliata.

CANNABINA, flore purpurascente; Cannabis spuria.

- flore magno, luteo, labiis purpureis; Cannabis spuria, slore maiore.

CANNABIS, non florens; sed semen ferens, satiua.

CAPSICVM, recuruis filiquis. Piper Indicum propendentibus filiquis.

- - fructu oblongo cordiformi rubro.

- - filiquis surrectis cordiformibus fru-Au rubro.

- filiquis surrectis rotundis.

- filiquis breuibus rubris propenden-

- filiquis propendentibus rubris cerafiformibus.

- - filiquis surrectis cerasiformibus ru-

- - Brasilianum fructu rotundo mini-

- - filiqualatiore et rotundiore.

- - fructu rotundo maximo dependente pomi amoris forma.

- - Latifolium mali aethiopici fructu magno compresso striato, Americanum.

- - fructu flauescente.

CAPSICV M filiqua propendente oblonga et cordiformi.

- - filiqua oblonga cordiformi.

- fructu longo, ventre tumido per fummum tetragono.

- filiquis surrectis rotundis parum acu-

minatis.

- - filiquis flauis erectis.

- - filiquis rotundis surrectis flauis.

- - filiquis surrectis et oblongis breuibus.

- filiquis surrectis, cerasi forma.

CARDAMINE, pratenfis, magno flore, purpurascente.

CARDVVS, spinosissimus, angustifolius, vulgaris, slore purpureo; syluestris.

- fpinofissimus, angustifolius, vulgaris, flore albo.

- lanceatus, latifolius, flore purpureo.

- - albis maculis notatus, vulgaris; Mariae.

- Syriacus, albis maculis notatus, flore purpureo.

exoticus, albis maculis notatus, flore

- - nutans, capite magno, odoro, nutante.

- - tomentofus, Acanthifolio, vulgaris;
Acanthium.

CAR-

CARDV v s, Creticus, Acanthi folio, viridi, flore purpurascente.

 Canescens, aculeis flauescentibus munitus; Chamaeleon Salmaticense.

- - fpinosissimus, caule glabro, moschatus; capite minore, segetibus frequens.

- palustris, caulium alis, foliisque atroviridibus, spinis mollioribus, pluri-

mis.

- Lustanicus canescens alato caule capite lanuginoso.

- - Mariae viridis.

CARLINA, Syluestris.

CARTHAMVS, flore croceo.

CARVI, Carum.

- - semine maiore, Hispanicum.

CASSIA, hexaphylla, minus foetida, foliis Sennae Occidentalis, fubtus incanis.

CATANANCE, latifolia, flore luteo; Chondrilla.

CAVCALIS, Aruensis, echinata, magno flore; Echinophora, flore magno.

- - maior, Daucoides, Tingitana.

- - Monspeliaca, echinata; Echinophora, semine magno.

- prima.

- - Aruensis, paruo flore; Echinophora prima.

- - Africana, folio minori Rutae.

G 3

CAV-

CAVCALIS, fyluestris, folio Chaerophylli.

- - nodosa, echinato semine.

CENTAVRIVM, minus, rubrum.

CEREFOLIVM.

- - fyluestre, Cicutae folio.

CERINTHE, quorundam maior, versicolore flore, ex flauo, purpuro-violaceo.

 quorundam maior, flore ex rubro purpurascente.

- - asperior, flauo flore.

- - minor flore flauo, claufo.

CHAMAEMELVM, vulgare.

 vulgare, tenuifolium, inodorum; Cotula non foetida.

- - marinum.

CHENOPODIVM, quod dicitur Pes Anferinus; Atriplex.

- folio finuato, candicante; Atriplex.

- angustifolium, laciniatum, vel non laciniatum, maius, et minus.

- - foetidum; Atriplex foetida.

- - Lini folio, villoso; Herbastudiosorum.

- - Ambrofioides, folio finuato; Botrys.

 Ambrofioides, Mexicanum; Botrys Mexicana,

CHENOPODIO-MORVS, maior; Atriplex, mori fructu, vel fragifera. CHONDRILLIS AFFINIS, Trinciatella.

CHONDRILLA, Sonchi folio, flore luteo, pallescente; Lactuca syluestris, murorum.

CHRYSANTHEMVM, folio Matricariae, flore luteo.

- folio Matricariae, flore luteo, pleno.

- - flore, partim candido, partim luteo.

- - folio Matricariae, flore albo, pleno.

 fegetum, facie Bellidis syluestris, foliis glaucis, Papaueris hortensis instar, profunde inciss, maius; Chryfanthemum.

CICER satiuum, flore ex purpura rubente, semine rubro.

- flore candido, fructu pallido.

CICVTA, maior.

- - minor, Petroselino similis; Cynapium.

CLINOPODIVM, fistulosum, pumilum, flore coerulescente.

- - Origano fimile, flore albo.

CLYMENVM, Hispanicum, flore vario, filiqua non articulata.

- Hispanicum, flore vario, filiqua articulata; Lathyrus folio pinnato.

- Bithynicum, filiqua fingulari, flore minore.

CNICVS, Atractylis lutea.

- - Atractylis alba dictus; Carduus Atra-G 4 Etylidis Etylidis facie, flore leucophaeo.

CNICVS, exiguus, capite cancellato, semine tomentoso, flore purpureo; Carduus minimus.

fyluestris, hirsution; Carduus bene-

diEtus.

COCHLEARIA, Hederae folio.

- folio subrotundo.

COLOCYNTHIS, fructu rotundo, maiore.

COLVTEA, Africana, annua, foliis paruis, mucronatis, vesiculis compressis.

COMMELINA, flore coeruleo, procumbens, saponariae folio.

CONRINGIA Cheiri folio viridi flore

luteo.

CONVOLVVLVS, Indicus, flore violaceo, maiore.

- Indicus, flore albo, purpurascente, semine albo.

- flore coeruleo, folio hederaceo.

- Lustanicus, flore azureo.

- Lustranicus, flore et semine albo.

- Siculus, annuus, coeruleus, minimus, flore paruo, auriculato.

CONYZA, coerulea, acris.

minor, flore globoso, luteo; Chrysanthemum conyzoides, palustre.

Americana, Lamii folio, Cacaliae flosculis; Eupatorium Senecionis facie.

Co-

CORIANDRYM, fatiuum.

- - syluestre minus, testiculatum.

COR INDVM, folio, et fructu maiore; Pisum cordatum.

- folio, et fructu minore.

CORONA SOLIS, flore aureo, femine nigro; Chryfanthemum.

- - maxima, flore aureo, semine albo.

- - maxima, floreaureo, semine cinereo.

- maxima, flore aureo, semine striato.

- - flore pallido fulphureo, femine ni-

- - flore pleno, aureo, semine albo.

- - flore flauescente, pleno, radio minore, semine albido.

- - flore flauescente, pleno, semine fusco.

CORONILLA, Cretica, herbacea, flore paruo purpurascente.

CORONOPUS, hortenfis.

CORISPERMVM hystopifolium.

COTVLA, flore luteo, radiato.

- - flore pallido, radiato.

- - flore luteo, nudo; Chryfanthemum Valentinum.

CVCVMIS, oblongus, fatiuus, vulgaris, flore luteo.

CVCVRBITA, lagenaria, flore, et fruæu albo, folio maiore Melonis.

- - longior.

- - latior.

CVMINOIDES, vulgare; Cuminum fyluestre, capitulis globosis.

CVMINVM.

CVSCVTA.

Cyanvs, floridus, odoratus, Turcicus, flore purpureo.

- odoratus, Turcicus, flore albo.

- - moschatus, flore luteo; moschatus Orientalis.

- fegetum, flore coeruleo.

CYNOGLOSSVM, minus, hirfutum, vineale, flosculis minimis, coeruleis.

CYSTICAPNOS, Africana, scandens.

D.

Davevs, fatiuus, radice alba; Staphylinus fatiuus.

- - fatiuus, radice Aurantii coloris.

- fatiuus, radice atro-rubente.

DELPHINIVM, Platani folio; Staphifagria.

- fegetum, flore coeruleo.

- - hortense flore coeruleo simplici.

- - hortense flore coeruleo pleno.

- - hortense flore purpureo seu violaceo pleno.

- - horrense flore purpureo seu violaceo fimplici.

- - hortense flore carneo simplici.

- - hortense flore carneo pleno.

DEL-

DELPHINIVM hortense slore niueo simplici.

- - hortense flore niueo pleno.

- hortenie, flore pleno, albo punctis et lituris coeruleis elegantissime vario.

#### E.

CHINOPVS, minor, capite magno, flosculis purpuro - violaceis.

ECHIVM, ramosius, annuum, flore suauiter rubente, caule rubris punctis notato.

#### ELATERIVM.

ENDIVIA, seu Intybus vulgaris.

- - vulgaris; Cichorium latifolium, flore candicante.

- - flore cocruleo.

- - crispa.

ERVCA, syluestris, flore luteo, foetens, foliis magis profunde dissectis.

- maior, satiua, flore albo, striato.

ERVCAGO, segetum.

- - semine crispo.

ERVVM.

ERYSIMVM.

- - Monspessulanum, Sinapios folio; an maius, et angustifolium? ERYSIMVM, polyceratium.

EVPATORIO-PHALACRYM Balfaminae folio.

- - Indicum Scrophulariae folio capitulo paruo radiis quinis ad bafin ornato hispidis et glutinosis.

#### EVPHRASIA.

- - pratensis, rubra.

- - non ramosa, pratensis, slore coeruleo, purpurascente.

F.

# EABA, maior.

- - minor.

FAGONIA, Cretica, spinosa.

FAGOPYRVM, vulgare, erectum; Frumentum Saracenicum.

- vulgare, scandens: Frumentum Saracenicum.

FERRVMEQVINVM, siliqua singulari.

- - siliqua multiplici.

FICOIDE S, Africana, folio Plantaginis, vndulato, micis argenteis adíperío, flore argenteo.

- Africana, procumbens, Portulacae folio, flore luteo; Kali aizoides, Canarienfe.

- - fiue Ficoidea, Hilpanica, folio longiore.

FI-

FILAGO, quae Impia.

- - minor, repens.

- - minor,tomentola, erecta; Gnapha-

FOENICVLVM, vulgare, Italicum, femine oblongo.

FOENVM GRAECVM.

- - syluestre, alterum.

- - polyceratum creticum, maius, flore luteo.

- - polyceratum, minus.

- - Tyluestre, Meliloti facie.

FVMARIA, vulgaris, flore purpureo.

- - minor, tenuifolia, flore niueo.

#### G.

G'ALEOPSIS, annua, Hispanica, rotundiore folio.

- patula, segetum, flore purpurascente; Ladanum segetum, folio latiore.

- - flore paruo, roseo, quae Stachys aruensis, minima.

GARIDELLA.

GERANIVM, Africanum, Coriandri folio, flore incarnato, et striis rubris.

- - Africanum, vuae crispae folio, floribus exiguis, rubellis.

- - minori folio, rotundo.

GERANIVM, semine nigro, coeruleo flore; Bohemicum, minus, Batrachioides, annuum.

- - annuum, rotundifolium, montanum, faxatile, lucidum, foliis crassis.

- - Creticum, acu longissima, flore coerulescente.

- - Cicutae folio minus, et supinum.

- - moschatum, Cicutae folio.

- - folio Alceae, tenuiter laciniato, flore exiguo purpureo, femine tenui.

GLAVCIVM, hirfutum, flore phoeniceo; Papauer corniculatum.

- - glabrum, flore phoeniceo.

- - flore violaceo; Papauer cornicula-

GRAMEN, da&tylon, angustifolium, spicis villosis.

- - dactylon, folio latiore; Gramen Ischaemon.

 - da&ylon, Orientale, maius, frumentaceum, femine Napi.

- - seu Festuca auenacea, sterilis, spicis, dependentibus, Bromos dista.

- - alopecuroides, seu paniceum, spica rotundiore.

- - alopecuroides, minus, spica virescente, diuulsa.

- - Barcinonense.

- - tremulum, maius, phalarinum.

IGRAMEN, tremulum, maximum, phalalaroides, citrinum, maius.

- tremulum, minus, panicula parua.

- Africanum, aculeatum, echinatum.

#### H.

TEDYPNOIS, Hieracium, capite in-I clinato semine adunco.

HEDYSARVM, annuum, flore rubente, filiqua vndulata.

annuum, angusto viciae folio, flore

paruo purpurascente.

HELIANTHEMVM, salicis folio; Cistus humilis, annuus,

annuum, Rosmarinifolio, flore luteo, minori, perianthio striato, vesicario.

HELIOTROPIVM, maius.

Americanum, vel Canariense, Hormini folio, flore coeruleo.

minus, angustifolium, aruense, hirsutum, flore minore; Scorpiurus.

angustifolium, palustre, glabrum; Echium Scorpioides.

HESPERIS, Leucoii folio, non serrato; Leucoium luteum, syluestre, angu-Stifolium.

Leucoii folio, dentato, paruo flore, luteo.

HESPERIS, maritima, florerubro, latifolia, filiqua tricuspide; Leucoium.

HIERACIVM Echioides, capitulis cardui benedicti, flore luteo.

 - amygdalas amaras olens, vel odore Apuli.

- - lanatum; Sonchus.

- '- medio nigrum; Baeticum maius, barbatum.

- - folio dentis leonis, flore fuauerubente, foetens, Apulum. -

- folio Chondrillae, glabrum; Chon-

drylloides.

- - minus, dentis leonis folio, oblongo, angusto, glabro.

- folio Endiuiae, capite magno, stria-

to.

- - feminis pappo rigido.

HORMINVM, satiuum, coma purpuroviolacea.

- - coma rubra.

HYOSCYAMVS, vulgaris, vel niger.

HYOSERIS.

HYPECOVM, Fumariae folio, flore luteo.

ĩ.

I ACE A, stellata, folio Papaueris erratici; Calcitrapa. IACEA, stellata, spina-solstitialis dicta, eyani folio.

- spinosa, caule alato, capite lanugino-

fo.

- - Cyanoides, caule alato, peregrina,

Napi folio.

- foliis cichoraceis, villosis, altissima, flore purpureo; Stoebe Salmaticensis.

- - cauliculis squamatis, argentea, ma-

ior, flore purpurascente.

- foliis candicantibus, tenuiter laciniatis, calyculis non fplendentibus.

IACOBAEA, Afra, folio Botryos.

 - Africana, flore amplo, purpureo, elegantissimo, folio Senecionis.

- Africana flore albo.

- - Senecionis folio, viscoso, flore luteo; Pannonica.

- - Aegyptiaca folio glauco Coronopi.

IALAPA, flore slauo; Mirabilis Peruuiana.

- - flore purpureo.

- - rugolo fructu.

- flore albo, purpureo, eleganter variegato.

IONTHLASPI, spicatum.

#### K.

ALI, spinosum.

KETMIA, vesicaria, Veneta.

- vesicaria, Africana; Alcea capitis bonae spei.

KNAWEL; Polygonum, graminis folio.

#### L.

LACHRYMA IOBI; Lithospermum arundinaceum.

LACTUCA, syluestris, costa et foliis in ambitu spinosis.

- fyluestris, angusto, saligno, et longiore folio, costa spinosa, albicante.

LACTVCAE variae species, ex illis LV. quas retulit Boerh.

LAMIVM, folio, caulemambiente; Galeoplis.

LANCISIA Pontederae.

LAMPSANA; Endiuia Napifolia.

LATATHVM, Aegyptiacum, capíula barbata.

LATHYRVS, distoplatyphyllos, hirsutus, magno, et paramoeno, odoro store.

LATHYRVS, praecedentis fimilis, magno flore, albo, et odoro vexillo rubro.

- Tingitanus, filiquis Orobi, flore amplo, ruberrimo.

- Hispanicus, flore ochroleuco.

- - Indicus, flore purpureo, filiqua hirfuta.

 angustifolius, siliqua Ochri, alata, vexillo coeruleo, siliqua latiore.

- angustifolius, idem, flore albo.

- - satiuus, flore albo.

- - Zeylanicus.

LAVATERA, folio, et facie Althaeae, flore albo.

 - Africana, flore pulcherrimo; Malua, femine tecto, Pannonica, vel aestiua, trimestris, Hispanica.

LENS, vulgaris.

- - maior, vulgaris, semine cinereo, ex nigro variegato.

LEVCANTHEMVM, Bellidis facie, vmbelliferum; After Canadenfis.

LINARIA, aruensis, coerulea.

- - triphylla, minor, flore luteo, pallido, calcari purpureo.

- - Chalepenfis, flosculis albis.

- - hirfuto folio, fubrotundo, flore, ex herbido flauescente.

- hirfuto folio, acuminato, in bafi auriculato, flore luteo.

#### LINOSYRIS.

LINVM, fatiuum.

- - fatiuum, latifolium, Africanum, fru-Lu maiore.

- - pratense, flosculis albis, catharcti-

Lotvs, flore rubro, filiqua angulosa; tetragonolobus.

- praecedenti similis, folio varie-

- - terragonolobus, flore luteo, filiqua angulofa, angulta.

- - filiquis Ornithopodii.

- pentaphyllos, minor, hirfuta, anguflissima filiqua; oligoceratos, Cretica, filiquis longis, erectis.

- - pentaphyllos, filiqua cornuta; Trifolium corniculatum, Creticum.

LVFFA, Arabum; Cucumis reticula-

L v P I N v S, peregrinus, maior, vel villofus, coeruleus.

- - fyluestris, flore coeruleo, minore.

- - peregrinus maior, flore incarnato.

- - Tatiuus.

- - syluestris, flore luteo.

LVTEOLA, salicis folio; Pseudostru-

LYCHNIS, segetum maior, flore rube-

Lychnis, Pseudo-Melanthio fimilis, Afra, glabra, angustifolia.

- Cretica, flore paruo, calyce striato,

purpurascente.

 fylueftris, latifolia, calyculis, turgidis, ftriatis, pericarpio ampullato, pyramidali, fulcato, flore rofeo.

- fyluestris, angustifolia, calyculis turgidis, striatis, minoribus, pyramida-

libus, flore carneo.

perfoliata, et vaccaria, aut pentagonia.

- Orientalis, annua, fupina, Anthirrina folio, flore minimo, purpurascente.
- - viscosa, purpurea, latifolia, laeuis; Centaurium adulterinum.

- viscosa, alba, latifolia, laeuis.

- - viscosa, foliis inferioribus Bellidis, flore minimo, rubro.
- noctiflora; Ocymoides non speciofum.

- - Tyluestris, minima, flore muscoso.

- fegetum, meridionalium, hirfuta, floribus albis, vno verfu dispositis.
- hirta, minor, floribus variegatis; Lufitanica, flore picto.

H 3

LYCHNIS, segetum, meridionalium, hirsuta, floribus roseis, vno versu di-

spositis.

- - pericarpio pyramidali, striato, reticulato, viscosa, store luteo, interne carneo, semine cuboide, punctato.

Lychni-Scabiosa, flore rubro; Scabiosa Orientalis.

LYCOPERSICVM, fructu cerafi, rubro.

- - fructu cerafiluteo.

- - Galeni. Solanum pomiferum fructu rotundo striato molli.
- - fructurubro non striato.
- - fructu rubro non striato.

- - fructu luteo.

- - fructu striato duro.

- - fructu striato duro sine umbone.

- - fructu striato duro minimo.

#### M.

MALVA, vulgaris, flore minore, folio ro-

- - Syriaca, pumila, flosculis albidis, ad cauliculos conglobatis.

- - Sinensis, erecta, flosculis albis, mini-

mis.

- - vulgaris, flore maiore, subrubente, folio sinuato.

... MAL-

MALVA, vulgaris, flore purpureo, pulchriore.

- - fyluestris, flore albo, folio sinuato.

 rotundifolia, Italica, flore amplo purpurascente; Althaea.

- - folio vario, stellata.

- - foliis crispis.

- - Americana, vlmi folio, floribus conglobatis.

MALVINDA, vnicornis.

MAYS, granis aureis; Frumentum Indicum.

- - granis rubis.

- granis coeruleis.

- - granis flauescentibus, vel albidis.

MEDICA, fructu echinato, maiore.

- - fructu echinato, maiore, albidiore. - - fructu echinato, maiore, oblongo,

spinis sursum et deorsum.

 fructu echinato, maiore, rotundiore, fpinis furfum et deorfum fpectantibus.

- - fructu echinato, minori.

- - fructu echinato, minori, spinis firmis; Trifolium cochleatum.

- - fructu echinato, exiguo.

- - fructu echinato, minimo; echinata hirfuta.

- - fructuechinato, mediocri, rectis breuioribus spinis. MEDICA, fructu echinato, dicarpos, alba.

fructu echinato, spinis rarioribus, reflexis, fru&u tribuloide.

fructu echinato, ad latera reflexis spinis breuioribus.

fructu echinato, echinis rectis, breuioribus.

fructu echinato, minori, echinis breuioribus.

fructu quasi doliato, maiore, non spinoso: similis fructui Trifolii falcati.

fructu doliato, minore, non spinoſo.

fructu doliato, minore, quodammodo spinoso.

Cretica, orbiculata, fructu vtrinque turbinato, maiore.

fructu scutellato, maiore, oris crispis.

fructu scutellato, maiore, oris non crispis.

fructu scutellato, minore; similis fru-Etui trifolii falcati.

frustu cochleato, fingulari.

fructu cochleato, minori, ad margines leuiter echinato.

fructu cochleato, maiore, capfula turbinata, plana.

fructu cochleato, dicarpos, turbinata, rugola.

MEDI-

MEDICA, fructu cochleato, minore, rugofo, albo.

MEDICAGO, annua, trifolii facie, siliqua

falcata, crenata; Medica.

- - Vulnerariae facie, hispanica, flore luteo; Falcata, folio Anthyllidis.

- - maritima, annua, trifolia, polycarpos, fructu toroso, non spinoso.

MELAMPYRVM, coma purpurascente.

- - luteum, fyluaticum.

MELILOTVS, supina, Cretica, folliculis rugosis, minoribus, spicis densis.

gofo, rotundo, albo; Orientalis, folliculis rugofis, maioribus.

- Messanensis; Italica, minor, folliculis

ftriatis, fingularibus.

- - capfulis, reni fimilibus, in capitulum congestis; minima.

- maior, odorata, violacea.

- - Cretica, fructu plano, orbiculari, maximo; trifolium peltatum,

MELO, vulgaris.

- - reticulatus.

- - rotundus, minimus, cortice tenuissimo, faccharinus. MELO, turbinatus.

rotundus paruus, aurantii figura et colore.

- - fructus cortice, atro viridi et verrucolo carne crocea, faccharinae dulcedinis.

Turcicus, femine signato. aliaeque species.

MELONGENA, fructu oblongo, violaceo.

- - fructu oblongo, flauo.

MELOPEPO, fructu maximo, albo; Pepo Indicus maximus, compressus.

- - verrucolus; Pepo verrucolus.

- tuberosus, et verrucosus.

MERCVRIALIS, testiculata, mas.

- spicata, foemina.

#### MILIVM.

- - nigris granis.

- - arundinaceum, fubrotundo femine; Sorgho nominatum, fructu albo.

MOLDAVICA, quae Cedronella, flore coeruleo.

- - quae cedronella, flore albo.

 Orientalis, flore minore, purpurafcente, folio ocymi.

- - Orientalis, Salicis folio, flore maiore, coeruleo.

e e

MOLVCCA, laeuis; Melissa Moluccana, odorata,

- - spinosa.

MOMORDICA.

- - semine magno.

MYAGRVM, monospermum, latifolium, glabrum, siliqua ventricosa, breui; Raphanistrum.

MYOSOTIS, Hispanica, segetum; Ceration, vel Alsine corniculata.

- - Orientalis, perfoliata, lychnidis fo-

- - aruensis, hirsuta, paruo slore.

MYOSVRVS.

MYRRHIS, nodola, annua, semine aspero.

- - annua, semine striato, laeui, prima.

- - annua, femine striato, villoso, incano; Daucus Creticus.

N.

NAPVS, Syluestris

- - satiuus.

NASTVRTIVM, Syluestre.

- hortense, vulgatum.

- - crispum.

- - syluestre, folio osyridis.

NASTVRTIVM, syluestre, capsulis cristatis, repens, folio cornu cerui.

- - syluestre, tenuissime incisum.

NICOTIANA, maior, latifolia, flore rubro.

- - minor, flore luteo; Petum aut Pria-

- - minor, flore luteo; infundibulo et calyce longiore.

NIGELLA, aruensis, cornuta, flore coeruleo.

- - latifolia, flore maiore, fimplici, coeruleo; Hispanica.

- latifolia, flore simplici, albo, hispa-

nica.

- angustifolia, flore coeruleo, maiore, fimplici, Romana.

- anguitifolia, flore maiore, pleno, coeruleo, Romana,

- flore minore, simplici, candido.

- Chalepensis, lutea, corniculis longioribus.

NIS SOLIA, vulgaris; Lathyrus angustifolius, sine capreolis.

0.

Ochrvs, folio integro, capreolos eminente.

OCHRVS,

OCHRVS, folio integro, capreolos emittente, semine nigro.

OCYMVM, odoreanisi.

- - latifolium, maculatum, vel crispum.
- foliis, fimbriatis, viridibus.
- - caryophyllatum, maius.
- - vulgarius, medium, flore et caule albo.
- - medium, foliis viridibus, in ambitu
- - minus, angustifolium, foliis ser-
- - minimum, caryophyllatum.
- - latifolium.
- OMPHALODES, Lustranica, lini folio, flore albo.

ONAGRA, angustifolium.

- ORNITHOPODIVM, radice, tuberculis nodofa.
- - Portulacae folio; Scorpioides.
- - floribus luteis, filiquis non articulatis, in circulum contortis.

ORYZA.

P.

PANICVM, Germanicum, panicula minore.

- Lalicum, panicula maiore.

PAPAVER, capitatum, vulgare.

#### PAPAVER.

- laciniatum rubrum, vnguibus purpureis.
- - laciniatum rubrum, vnguibus albis.
- - multiplex, album, oris rubicundis.
- Hore multiplicato, incarnato.
- - flore multiplici, purpurascente.
- - flore pleno, album.
- - flore pleno, violaceo.
- - flore pleno, eleganter striato, laci-
- - flore pleno argentei coloris.
- flore pleno rubrum.
- - flore miniato pleno.
- - hortense semine albo slore leuiter purpureo.
- hortense, semine nigro, syluestre Dioscoridis, nigrum Plinio.
- - hortense, semine albo, flore candido, rubris maculis infecto.
- hortense, semine albo, flore cinereo vndique purpureo.
- - hortense, semine albo, satiuum Dioscoridis, album Plinii.
- erraticum, maius, Rhoeas Dioscoridi, Plinio, Theophrasto.
- - erraticum, flore pleno.
- - erraticum, maius, florum vnguibus
- - erraticum, maius, foliis florum varie-

PA-

- PAPAVER erraticum, maius, flore albo.
- - erraticum, flore pleno, purpurafcente.
- - erraticum, flore pleno, igneo.
- - erraticum, flore pleno, igneo, marginibus candidis.
- PARTHENIASTRVM, Americanum, Ambrofiae folio, paruo flore, albo; Matricaria, Americana.
- PEDICVLARIS, pratenfis, lutea; Crista galli.
- PELECINVS, vulgaris; Vtrinque ser-
- PEPO, vulgaris; Cucurbita maior, rotunda.
- - rotundus, aurantii forma.
- - oblongus.
- compressus, maior.
- - rotundus, aurantii colore.
- - fructu paruo, pyriformi ex viridi et albo variegato.
- - tuberosus et verrucosus sauescens.
- - tuberosus et verrucosus flauus.
- - feu Melopepo clypeatus, compressus et angulosus, colore slauo.
- - feu Melopepo, clypeatus, compresfus et angulosus, ex slauo et viridi variegatus.

PERFOLIATA, vulgatissima, aruensis.

PERSICA RIA, Orientalis, maxima, Nicotianae folio, calyce florum purpureo.

PHALANGIVM, humile, Africanum, flo-

ribus luteis.

PHALARIS, maior, semine albo.

- - fpica longiore.

PHASEOLVS, vulgaris, fructu albo.

- - vulgaris, fructurubro. - - vulgaris, fructu luteo.

- - vulgaris, fructu albo, et nigro, striato.

- - vulgaris, fructu albo, minore, venereus dictus.

- vulgaris, minor, fructuincano, cuius hilus limbo nigro cingitur.

 vulgaris minor, fructu albo, cuius hilus limbo fusco cingitur.

- - puniceo flore, fructu magno, nigro.

- puniceo flore, fructu, ex nigro, et colossino variegato.

- - Indicus, flore, et fructu candidisfimis.

- - Aegyptiacus, nigro femine; Lab-

- - Aegyptiacus, semine russo.

- - Aegyptiacus, femine obsolete luteolo.

. - orthocarpos, Indicus, flore coeruleo,

ruleo, filiqua crassiore, semine nigro.

PHASEOLVS, orthocarpos, Infulae Barbados, flore pallido, rubente, filiqua tenuiore, femine, ex purpureo nigricante.

PISVM, maius, quadratum, fructu sub-flauo.

- filiqua carnofa, incurua, feu falcata, eduli.
- - nanum.

- - praecox, Anglicum.

- - hortense, maius, flore et fructu albo.
- - comofum.

- - cortice eduli, fructu fusco.

PLANTAGO rosea, floribus quasi in spica dispositis.

- folio denticulato, angusto, paniculis, Lagopi.

POLYGALA, flore coeruleo.

POLYGONVM, vulgare, mas.

PORTVLACA, domestica.

- " aurea, foliis flauis.

- - angustifolia, syluestris.

- - Curassauica, lanuginosa, procumbens.

Psyllivm, maius, erectum, latifolium, annuum.

Q

OVAMOCLIT, Americana, folio hederae, flore coccineo.

R.

RANVNCVLVS, stellatus, echinatus, Creticus.

- aruensis, echinatus, minor.

RAPHANISTRVM, legetum, flore luteo, vel pallido.

- flore albo, striato, siliqua articulata,

striata, minore.

- dispermum.

RAPHANVS, maior, niger, orbicularis.

- maior, niger, radice-pyriformi, vel longiori.

- maior, albus, orbicularis.

- - maior, albus, radice pyriformi, vel longiori.
  - minor, oblongus.
- - minor orbicularis.
- minor oblongus ex rubro striatus.

RAPISTRVM, monospermum, orientale, Raphani folio, flore luteo, maximum.

RAPVM, rotundum.

- - radice oblonga.

RESEDA, flore albo.

RHA-

RHAGADIOLVS, hieracium filiqua falcata.

RICINOIDES, ex qua paratur Tournefol Gallorum.

RICINVS, vulgaris.

- - Africanus, maximus, caule geniculato, rutilante.

- totus ruber.

- vulgaris, minor.

RORELLA, rorida.

R v B I A, syluestris.

S.

SALICARIA, hyssopi folio, latiore; Gratiola minor.

SALICORNIA.

SAMOLVS.

SATUREIA, satiua.

SCABIOSA, Syriaca, annua, flore coeruleo, Syuan Syriae di Eta.

- altissima, annua, foliis Agrimoniae

nonnihil similibus.

- - stellata, folio laciniato, maior; Hispanica, flore albo.

- - stellata minor, folio laciniato, flore pallido coeruleo, hispanica.

- - stellata prolifera.

- - peregrina, rubra, capitulo oblongo.

SCA-

SCABIOSA, peregrina, capitulo oblongo, flore atropurpureo, odore Zibethi.

- - peregrina, alba, capitulo oblon-

- - Cretica, capitulo pappos mentiente.

SCANDIX, semine rostrato, vulgaris.

SCLAREA, glutinosa, annua, flore caesso, foliis oblongis, integris, odorem Thymi debiliorem reddentibus.

SCOLYMVS, Chryfanthemus; Carduus Chryfanthemus, lactescens.

SCORPIOIDES, folio Bupleuri; Campoides hispida, filiquis minus contortis.

- - siliqua crassa, instar Litui contorta.

- Bupleuri folio, corniculis asperis, magis in se contortis.

SCORZONERA, laciniatis foliis minoribus, flore luteo; Tragopogon.

SCROPHVLARIA, folio vrticae, flore rubro.

- - annua, lamii folio, flore luteo.

SECVRIDACA, lutea, maior.

SED VM, echinatum, flore albo.

- Cepaea dictum, floribus purpurafcentibus.

SENECIO, vulgaris.

- - Aegyptiacus, folio matricariae.

SE-

SENECIO, Africanus, altissimus, Blattariae, vel Hieracii folio, odore Carotae.

- Bonariensis, purpurascens, foliis imis Coronopi.

SERRATULA, semine ciliari, elegantissimo; Crupina Belgarum.

SESAMVM, veterum.

SICYOIDE S, Americana, fructu echinato: Bryonioides vulgo dicta; Cucumis.

SIDERITIS, aruenfis, latifolia, florealbo, barba luteola.

- - flosculis vix ex vasculis prominentibus.

- - vulgaris erecta, Betonicae angustiore folio, flore albo, et luteolo.

SINAPI, rapi folio, feminerusto, filiqua glabra.

- Apii folio, filiqua hirfuta, femine flauo.

- - Indicum, lactucae folio, filiqua glabra.

- - filiqua hirfuta, femine nigro, minore, an quernis foliis?

 filiqua hiríuta, femine nigro, maiore.

- - Chinense, foliis Acanthi, tenuius, et crebrius laciniatum, filiqua glabra.

SINAPISTRVM, Indicum, pentaphyllum, flore carneo, non spinosum. SISYMBRIVM, folio abfynthii minoris; Accipitrina.

SOLANVM, acinis nigricantibus.

- - acinis puniceis.

- acinis ex luteo virescentibus.

- - Guineense, fructu Cerasi magno, nigerrimo, vmbellato.

SONCHUS, asper, non laciniatus.

- laeuis, laciniatus, latifolius, flore luteo.
  - laeuis, laciniatus, latifolius, flore ni-
- - asper, laciniatus, Creticus, flore luteo, capitulis magnis, semine curuo.

SPINACHIA, vulgaris, capsula seminis aculeata.

 - Cretica, fupina, capfula feminis aculeata.

STRAMONIVM, fructu spinoso, rotundo, flore albo, simplici; Datura Turcarum.

- - fructu spinoso,oblongo,caule,et flore violaceo.

- - ferox.

- - fructu spinoso, rotundo, flore duplici, violaceo.

- - folio hyoscyami, flore toto candido, fructu propendente, rotundo, tundo, spinis innoxiis ornato; Stramonia.

STRAMONIVM, flore albo, duplici et triplici.

#### T.

TAGETES, maximus, rectus, flore fimplicies luteo pallido, flos Africanus.

 maximus, rectus flore maximo multiplicato pallido.

- maximus, rectus, flore simplici, au-

reo

- maximus, rectus, flore maximo multiplicato.

- Indicus, flore simplici, fistuloso.

- - Indicus, flore fiftuloso, duplicato.

- - Indicus, flore simplici, fistuloso, pal-

- Indicus, flore fistuloso, duplicato, pallido.

- Indicus, medius, flore simplici, luteo, pallido.

- Indicus, medius, flore luteo, multipli-

cato.

 Indicus, minor, fimplici flore, fiue Caryophyllus Indicus;

re, seu Caryophyllus, Indicus,

plenus, flore luteo rubescente, minor.

THLASPI, aruense, filiquis latis.

- - spicatum, Persicum, persoliatum,
- - Creticum, flore rubente.
- - Cappadocicum, flore albo.
- THLAS PIDIVM, Monspeliense, Hieracii folio, hirsuto; Leucoium biscutatum.
- - Apulum, spicatum; Leucoium asperum, biscutatum, minus.
- TITHYMALVS, foliis rotundis, non crenatis.
- TORDYLIVM, maximum, limbo minus granulato.
  - Narbonense, minus.
- - Apulum, minimum.
- Trachelivm azureum vmbelliferum.
- TRIBULUS terrestris, ciceris folio, fru-Etuaculeato.
- TRIFOLIVM, Lagopoides, hirsutum, hispanicum, flore coccineo, folio rotundo; Lagopus latifolius.

- Lagopoides flore subluteo.

- - aruense, humile, spicatum; Lagopus.
- - humile, flore albo, ípica longiore, glumis breuibus, incanis.

TRI-

### TRIFOLIVM, subterraneum.

- - flosculis albis, in glomerulis oblongis, asperis, ex geniculis florens.
- - Lupulinum, minus.
- stellatum, flore ex albo rutilante,
   spica longa, glumis longis, hirfutis.
- - caule nudo, glomerulis glabris.
- - maius, Apulum, rotundifolium, glabrum, flore purpurafcente, echinato capite, calyce vesicario.

- - capitulo spumoso, laeui, fragiferum.

- - Lagopoides, flore albo, seu Alopecurum, spica globosa.

#### V

## VALERIANA Calcitrapae folio.

- VALERIANELLA, aruenfis, praecox, humilior, femine depresso, nudo, vmbilicato, foliis integris, flore dilute coerulescente.
- aruensis, praecox, humilis, foliis serratis, flore albo, semine vmbilicato, pyramidali.

- - femine stellato, folio serrato, store albo, scabiosae semine. VALERIANELLA, Cretica, fructu veficario.

- - cornucopioides, rubra, Indica.

 cornucopioides, Mauritanica, flore purpureo, longiore; rubra, hispanica.

VERBENA, tenuifolia; Verbenaca fupina.

VERONICA, minima, repens.

- - Cymbalariae folio, verna.

- - folio Chamaedryos.

- - coerulea, trifido, aut quinquifido folio; Rutae folio.

- Chia, folio Cymbalariae, verna, flore albo, vmbilico virescente.

VICIA, Narbonensis, latissima, folio non ferrato.

- - fatiua, vulgaris, femine nigro, fegetum.

- - flore albo, filiqua longa, glabra.

 Africana, folio, et filiquis latis, hirfutis, propendentibus, flore ochroleuco.

- - latifolia, filiqua tumidiore, femine nigrescente, flore maiore, roseo.

- - angustifolia, siliqua glabra, longiore, et minus depressa, slore purpureo. VICIA, Graeca, flore suauerubente, siliquis breuissimis.

- Bengalenfis, hirfuta et incana, filiquis

Pili.

- - floribus et filiquis minimis; Cracca VIOLA, tricolor, hortenfis, repens; Flos Trinitatis, aut Iacea.

- - bicolor, aruenfis.

VIRGAAVREA, annua; Conyza Canadenfis, acris, alba, Linariae folio.

- maior, foliis glutinosis, et graueolentibus; Conyza maior.

- - minor, foliis glutinosis, et graueolentibus.

VISNAGA; Gingidium.

VRTICA, minor.

- - pilulas ferens, Romana, folio ferra-

- pilulifera, Parietariae folio.

VVINERARIA, pentaphyllos; Anthyllis Hispanica.

- pentaphyllos, flore purpureo.

X.

XANTHIVM, Bardanae folio, minore.

- - maius, Canadenie, fructu, aculeis aduncis munito.

K 2

XAN-

XANTHIVM Lustranicum, spinosum. XERANTHEMVM, slore simplici, purpureo, maiore.

- flore simplici, albo; Ptarmica Au-

striaca.

- - florealbo pleno, et purpureo pleno,

Z

ZAZINTHA; Cichorium verruca-



ar galanta a katalan

No. 2

The state of the s

ALM AND DEL









